

Mayıs başında yağış ve dolu riskinde artış

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.05.2020 Брой: 5/2020



Önümüzdeki yedi günlük dönemde, tarımsal meteorolojik koşullar, Mayıs ayının ilk on günü için iklim normlarına yakın ortalama günlük sıcaklıklar ve dengesiz hava koşulları tarafından belirlenecek. Dönem boyunca yaygın yağışların yanı sıra, sonbaharda ekilen ürünlerin ve ekilen ilkbahar ürünlerinin vejetasyonu için koşullarda bir iyileşme öngörülmektedir. Kuzeydoğu bölgelerindeki şiddetlenen ilkbahar kuraklığının ardından, beklenen yağışlar kritik durumda olan kışlık tahıl ürünlerinin bir kısmının toparlanması için fırsat sağlayacaktır. Kuzeydoğu Bulgaristan'ın birçok yerindeki toprak nemi eksikliği, buğday gelişimi için sınırlayıcı bir faktör ve ekili alanların bir kısmında sararmaya neden olmuştur.

Güneybatı bölgelerde ve Trakya Ovası'nın çoğunda, Nisan ayında ekonomik öneme sahip yağışlar düştü - bazı yerlerde 50-60 l/m²'nin üzerinde (Kyustendil-67 l/m², Blagoevgrad-52 l/m², Sandanski-73 l/m², Pazardzhik-83

l/m², Filibe-87 l/m², Hasköy-93 l/m², Eski Zağra-50 l/m², Çırpan-67 l/m²), kışlık tahıl ürünlerinin durumu iyidir.

Önümüzdeki dönemde, tarla alanlarında buğday ve arpa, sap uzamasından başaklanma ve sapa kalkma evresine geçiş yapacaktır. Mısır ve ayçiçeği için ise ekim tarihlerine bağlı olarak çıkış ve yaprak oluşumu evreleri gözlemlenecektir.

Mayıs ayının ilk haftasında, tarım ürünleri için kritik minimum sıcaklıklar öngörülmemekle birlikte, dolu olasılığı yüksek kalmaktadır. Dolu zararı durumunda, etkilenen ürünlerin ikincil enfeksiyon riskini azaltmak için ilk fırsatta bakır içeren fungisitlerle muamele edilmesi önerilir.

Kaynak: NIMH