

Temmuz için Tarımsal Meteorolojik Tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.07.2020 Брой: 7/2020



Temmuz ayının ilk on günlük döneminin ilk yarısında, tarım ürünlerinin gelişimi normalin üzerindeki termal koşullar altında ilerleyecektir. Ayın başında, ülkenin büyük bölümünde, aşırı kuzeybatı (Buzovets tarımsal meteoroloji istasyonu) ve güneybatı bölgeleri (Sandanski tarımsal meteoroloji istasyonu) hariç, ilkbahar ürünlerinin vejetasyonu, 50 cm ve 100 cm katmanlarda iyi toprak nem rezervleri koşullarında (tarla kapasitesinin %75-80'inden fazla) gerçekleşecektir – bu, yer yer 90-100 l/m²'yi aşan (Montana – 96 l/m², Veliko Tarnovo – 133 l/m², Ruse – 90 l/m², Silistra – 136 l/m², Dobrich – 105 l/m², Varna – 103 l/m², Kazanlak – 104 l/m², Haskovo – 92 l/m², Kardzhali – 173 l/m², Stara Zagora – 115 l/m²) normalin üzerindeki önemli Haziran yağışlarının bir sonucudur.

İlk on günlük dönemde, mısır hibritlerinin erkenciliğine bağlı olarak çeşitli fenolojik dönemler görülecektir: yaprak oluşumu, koçan çıkarma, koçan çiçeklenmesi ve püskül çıkarma. Ayçiçeğinde, ova alanlarındaki tarlalarda çiçeklenme dönemi hakim olurken, yüksek alanlardaki bitki örtüsünde ise çiçeklenme başlangıcı görülecektir. Tane baklagillerde (fasulye, soya) bakla oluşumu gözlenecektir.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemin başında, tarım ürünlerinin gelişimi ılımlı bir hızda, dönem normalleri civarında ve hafif altındaki sıcaklıklarda ilerleyecektir. Bu dönemde tahmin edilen sık yağışlar, su ihtiyacının keskin bir şekilde arttığı (mısırdaki koçan çıkarmadan süt olum dönemine kadar olan sürede günlük su tüketimi 6-7 m³/dekara ulaşır) üreme gelişim aşamasındaki ilkbahar ürünleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Temmuz ayının üçüncü on günlük döneminin başında, ova alanlarındaki erkenci mısır hibritlerinin bir kısmı süt olum dönemine girecektir. Ayçiçeğinde ise tane oluşumu ve dolumu gerçekleşecektir. Ayın sonunda, tarımsal teknik zaman dilimi içinde ekilen bitki örtüsünde, yer yer Tuna Ovası ve güney bölgelerde olgunlaşma döneminin başlangıcı gözlenecektir.

Temmuz ayının son haftasında, tarımsal meteorolojik koşullar nispeten kuru, ılık ve sıcak hava ile belirlenecek olup, bu durum geçici mısır hibritleri ve geç tarla üretiminden gelen sebze ürünleri için uygun bir sulama rejiminin uygulanmasını gerektirecektir. Bu dönemdeki meteorolojik koşullar, sebze ürünleri ve meyve ağaçlarındaki külleme ile asmalardaki külleme (oidium) hariç olmak üzere, bir dizi fungal hastalığın gelişimini sınırlandıracaktır.

Temmuz ayında, meyve ürünlerinde elma içkurdu, yaprakbiti ve akarların ikinci nesline karşı bitki koruma ilaçlamaları hafife alınmamalıdır. Bitki koruma uygulamalarını gerçekleştirmek için daha uygun koşullar, ilk ve üçüncü on günlük dönemlerin çoğu gününde, günün daha serin saatlerinde oluşacaktır.

Temmuz ayının en sıcak dönemlerinde, maksimum sıcaklıkların 38-39°C'ye kadar çıkmasıyla birlikte, tahıl hasadı sırasında yangın riski artacaktır.

Kaynak: NIMH