

Patates uyuzu

Автор(и): Л. Димитрова; М. Лагинова

Дата: 26.01.2014 Брой: 1/2014



Patates siğili hastalığı, patates bitkisinin kökleri dışındaki tüm kısımlarını etkiler. Kolayca tanınabilen belirtilerle meristematik dokuları enfekte eder. Tümörler başlangıçta parankim dokusundan oluşur ve daha sonra büyümeler 1-8 cm çapında karnabaharı andırır. Genellikle tümör, yumrunun tamamını kaplar veya belirgin yumrular olmaksızın sadece büyük tümörler bulunur. Yüzeyin üstünde yeşilden kahverengiye değişirler. Yetiştirme mevsiminin sonuna doğru siyaha döner ve parçalanırlar. Yüzeyin altında, tümörler kök boğazının, stolonların tabanında ve yumruların gözlerinin çevresinde belirir. Beyazımsıdan kahverengiye değişirler ve hasada kadar fark edilmeyebilirler. Tümörler depolama sırasında da gelişebilir. Bu dönemde, siğil hastalığının belirtileri, sözde siğil (pseudowart) olarak bilinen durumla karıştırılabilir. Bu, yumru gözündeki tüm tomurcukların kendiliğinden filizlenmesini ifade eder.