

Eylül ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.09.2020 Брой: 9/2020



Eylül ayında da, Batı Bulgaristan'daki agrometeorolojik koşullar, ülkenin doğu bölgelerindekilerden önemli ölçüde farklılık gösterecek.

Doğu Bulgaristan'da bu koşullar, normalin üzerinde sıcaklıklar ve normalin altında yağışlarla belirlenecek. Doğu bölgelerdeki birçok yerde, uzun süren yaz kuraklığı sonucunda, ilkbahar ekili ürünler vejetasyonlarını erken tamamladı. Bu alanlarda, ayçiçeği ve erkenci mısır hibritlerinin hasadı, olağan tarihlerden daha erken başladı ve verimler ülke ortalamasının oldukça altında kaldı.

Eylül ayında, batı bölgelerin çoğunda, geç tarım ürünlerinin gelişiminin son aşamaları, normalin üzerinde sıcaklıklar, iklim normlarına yakın yağış ve 50 ile 100 cm katmanlarda iyi yaz sonu toprak nem rezervleri (tarla

kapasitesinin %70'inin üzerinde – Nikolaevo, Kyustendil, Sandanski) altında gerçekleşecek – bu, Ağustos ayındaki normalin üzerindeki yağışların bir sonucudur (Vidin – 67 l/m², Lom – 80 l/m², Sofya – 84 l/m², Kyustendil – 98 l/m², Blagoevgrad – 152 l/m², Sandanski – 107 l/m²).

Eylül ayının ilk on günlük döneminde, ülkenin batı yarısı için tarımsal açıdan önemli yağışların yeniden tahmin edildiği bildiriliyor. Bu yağışların, ikinci ürünler ve süt olumu aşamasında olacak geçici mısır hibritleri üzerinde olumlu bir etkisi olacak. Bu on günlük dönemde, tarla alanlarında orta-geçici hibritler balmumu olumu aşamasına girecek. Ayın ortasına kadar, geçici hibritlerin bir kısmı gelişimini tamamlayacak. İkinci on günlük dönemde, pirinç balmumu ve tam olum aşamalarında olacak. Üçüncü on günlük dönemde, olgunlaşma aşaması pamuk, yer fıstığı, sonbahar meyve ağacı çeşitleri ve daha geçici üzüm çeşitlerinde gerçekleşecek. Ay için tahmin edilen minimum sıcaklık değerleri, sebze bitkileri için kritik eşiklerin üzerinde olup, bu da geç tarla yetiştiriciliğinden ek sebze üretimi elde edilmesi için bir ön koşuldur.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerin çoğu gününde, nispeten kuru hava beklenmekte ve koşullar ilkbahar ekili alanların temizlenmesi için uygun olacaktır.

Eylül ayında da, doğu bölgelerin büyük bir kısmında, üst toprak katmanlarındaki nem eksikliği, kış yağlık kolza ve kış tahıl ürünleri ekimi için ayrılan alanlarda derin sürüm ve ekim öncesi toprak işlemenin kaliteli bir şekilde yapılmasını engelleyecek. Yağlık kolza ekimi için optimal zaman aralığı, ayın ikinci on günlük döneminin sonuna kadardır. Üçüncü on günlük dönemde, daha yüksek rakımlı tarlalarda arpa ve buğday için agroteknik ekim tarihleri başlar.

Kaynak: NIMH