

Ekim ve Kasım aylarında tarlaları tarla faresi için düzenli olarak kontrol edin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2020 Брой: 10/2020



Ekim ve Kasım aylarında, sonbahar ürünleri kontrol edilmeli ve zararlı tarla faresinin popülasyon yoğunluğu ekonomik zarar eşiğini (dekar başına 2 aktif koloni) aştığında mücadele önlemleri gereklidir.

Tarla faresi (*Microtus azvalis*) – tüm ülke genelinde yaygındır. Tahıl ürünlerine, yoncaya, kanolaya, meyve bahçelerine vb. zarar verir. Toprak yüzeyinde değişen sayıda açıklığı olan uzun tünellerde koloniler halinde yaşar. Yaşanabilir koloniler, dağınık toprak yığınları, iyi şekillenmiş açıklık ve içine yerleştirilmiş yeşil yapraklarla tanımlanır. Sıcak ve kış kışlarında, farenin üreme kapasitesi çok yüksektir. Yıl boyunca ürer ve tek bir çiftten gelen yavrular 2400 bireye kadar ulaşabilir. Bitkinin yeşil kısımlarıyla beslenir. Zarar, ürün çıkışından hasada kadar gözlemlenir. Şiddetli istila durumlarında, ürün standı seyrekleşir. Hasattan sonra, kolonileri yok etmek ve

fare için yiyecek görevi gören potansiyel olarak ortaya çıkabilecek yabancı ot bitki örtüsünü ortadan kaldırmak için derin sürüm önerilir. Tarla kontrolleri sırasında, farenin popülasyon yoğunluğu belirlenir ve dekar başına 2 aktif koloni bulunduğunda, zehirli yemler açıklıklara (yaşanabilir olanlara) yerleştirilir ve kuşları ve faydalı av hayvanlarını korumak için ayakla ezilir. Mücadele, bu amaç için yetkilendirilmiş rodentisitler (Phostoxin peletleri) – kolonilerin girişlerine yerleştirilen zehirli yemler ile gerçekleştirilir.