

'Ekim ayının ortasında mevsimlik agroteknik faaliyetlerin yürütülme koşullarının iyileştirilmesi'

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.10.2020 Брой: 10/2020



Ekim ayının ikinci on günlük döneminde, agrometeorolojik koşullar kararsız hava durumu ve Ekim normallerine yakın sıcaklıklarla belirlenecek. Geçtiğimiz dönemdeki önemli yağışlar, ülkenin birçok bölgesinde 40-50 l/m²'yi aştı (N. selo - 66 l/m², Loveç - 61 l/m², Plevne - 73 l/m², V. Tırnovo - 61 l/m², Sviştov - 51 l/m², Kazanlık - 73 l/m², Kırcaali - 60 l/m², Eski Zağra - 54 l/m², Çırpan - 60 l/m², Karnobat - 63 l/m²), bu da üst toprak katmanlarındaki toprak nem rezervlerinde ve ekilen sonbahar ürünlerinin vejetasyonunun ilk aşamaları için koşullarda keskin bir iyileşmeye yol açtı. Dönemin başında, daha fazla yağış ve 50 cm toprak katmanındaki toprak nem rezervlerinde bir artış bekleniyor. Batı ve Orta Bulgaristan'ın birçok yerinde, bu rezervler tarla kapasitesinin %75'ine kadar ve

üzerinde seviyelere ulaşacak. Uzun süreli kuraklıktan en çok etkilenen ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde de toprak nem seviyelerinde olumlu bir değişiklik bekleniyor.

Dönemin ortasında, sıcaklıklarda önemli bir düşüş ve ova alanlarında - dona karşı hassas sebze ürünleri için kritik minimum değerler tahmin ediliyor. Ekilen sonbahar ürünlerinin gelişimi, ikinci on günlük dönemin sonunda ve üçüncü on günlük dönemin başında, normalin altındaki termal koşullar altında ilerleyecek. Ekim ayının ilk on günlük döneminde ekilen buğday ve arpada, çıkış aşaması baskın olacak. Daha erken ekilen kışlık tahıl ürünlerinde, Eylül sonu ve Ekim başında, yaprak oluşumu (1–2 yaprak) gözlemlenecek.

Dönemin sonunda, mevsimlik agroteknik faaliyetlerin (en önemlisi buğday ekimi) yürütülmesi için koşullarda bir iyileşme bekleniyor. Önümüzdeki yedi günlük dönem, Güney Bulgaristan'da kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için agroteknik dönemle örtüşüyor.

Ekim ayının üçüncü on günlük döneminde, daha erken ekilen buğday ürünlerinde, belirli zararlıların popülasyon yoğunluğu izlenmelidir: tarla faresi, buğday yaprak böceği, tahıl sinekleri vb., bunlar kışlık tahıl ürünlerine vejetasyonlarının ilk aşamalarında ciddi zarar verir.

Kaynak: NIMH