

Yıl başında tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.01.2021 Брой: 1/2021



Ovağa alışılmışın üzerindeki Aralık sıcaklıkları, ova bölgelerindeki birçok yerde (Kneja, Plevne, Lofça, Veliko Tırnovo, Rusçuk, Silistre, Pazarcık, Filibe, Eski Zağra, Çırpan, Elhovo, Varna, Burgaz) maksimum değerlerin 17-18°C'ye ulaşmasıyla, sonbaharda ekilen ürünlerdeki vejetatif süreçleri uzattı. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, bazı erken çiçek açan meyve türlerinde (şeftali, kiraz) erken tomurcuk şişmesini tetikledi ve bu da onların soğuğa dayanıklılığının azalmasına yol açacak.

Ocak ayının ilk on günlük döneminde, tarımsal meteorolojik koşullar normalin üzerindeki sıcaklıklarla belirlenecek. Ayın başında, ova bölgelerindeki birçok yerde, ortalama günlük değerler yine kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonu için gerekli olan biyolojik minimumu aşacak.

Sonbaharda ekilen ürünlerde soğuma ve vejetatif süreçlerin durması, ilk on günlük dönemin ikinci yarısında bekleniyor.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerde, iklim normallerine yakın tahmin edilen sıcaklıklar, kışlık tahılları ve kanolayı dinlenme durumunda tutacak. Beklenen yaygın kar yağışı, sonbaharda ekilen ürünlerin kışlama koşullarını iyileştirecek. Buğday, uzayan sonbahar kuraklığı ve geciken ekim nedeniyle farklı fenolojik aşamalarda kışa girdi. Sonbahar sonunda ekilen geç ekilmiş kışlık tahıllar, ülkenin güney bölgelerindeki bazı yerlerde (tarımsal meteoroloji istasyonları – Filibe, Hasköy, Lyubimets, Sliven, Yanbol) iyi gelişmemiş durumda ve çıkış ile erken yaprak oluşumu aşamalarında. Buğday ekili alanların önemli bir kısmı üç yaprak aşamasında kışlayacak. Kışlamak için uygun aşama olan kardeşlenme aşamasında ise, optimal tarımsal teknik dönem içinde ekilen kışlık tahıllar bulunuyor (tarımsal meteoroloji istasyonları – Bazovets, Novachene, Pavlikeni, Targovişte, Sandanski, Pazarcık, Karnobat, Dolni Çiflik).

Ocak ayında, kar örtüsü olmayan ve daha uzun süreli kalıcılık gösteren koşullarda, eksi 15°C'ye kadar düşmesi tahmin edilen minimum sıcaklıklar, kardeşlenmemiş kışlık tahıllar ve sonbahar vejetasyonu döneminde rozet oluşturamamış kışlık kanola ekili alanları için kritik olacak.

Ocak ayında beklenen, norm civarında ve üzerindeki yağışlar, 100 cm katmandaki toprak nem rezervlerini artıracak. Aralık ayındaki normalin üzerindeki yağışlar (Kırcaali – 194 l/m², Hasköy – 142 l/m², Sliven – 125 l/m², Eski Zağra – 123 l/m², Silistre – 109 l/m²) üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerini keskin bir şekilde artırdı. Kışın başında, buğday tarlalarında, ova bölgelerinin çoğunda 50 cm katmandaki toprak nem rezervleri tarla kapasitesinin (TK) %85-90'ının üzerinde seviyelere ulaştı.

Ocak ayında, bağlarda ve meyve bahçelerinde kış budaması yapmak için daha uygun koşullar üçüncü on günlük dönemde oluşacak.

Kaynak: NIMH