

Ocak ayının ikinci yarısında, agrometeorolojik koşullar önemli bir değişiklik geçirecek.

Автор(и):

Дата: 20.01.2021 Брой: 1/2021



Ocak ayı başında, ülkenin çeşitli bölgelerinde normalin üzerinde yağış kaydedildi – 90-100 l/m² (Vidin - 109 l/m², Vratsa - 125 l/m², Dragoman - 128 l/m², Blagoevgrad - 128 l/m², Sandanski - 136 l/m², Haskovo - 101 l/m², Kırcaali - 129 l/m², Şumen - 113 l/m², Varna - 122 l/m², Elhovo - 140 l/m², Karnobat - 120 l/m², Burgas - 153 l/m²). Bu durum, sonbaharda ekilen ürünlerin bulunduğu alanlarda su baskınlarına yol açtı.

Aynı zamanda, Dobruca Tarım Enstitüsü, özellikle yılın bu zamanında, son iki yıldır bu kadar bol ve doyurucu yağışların meydana gelmediğini bildiriyor. Prof. Ivan Kiryakov'a göre, yağmurlar sonbahar ekili ürünler için verimli nem sağlamış olup, 1 ila 1.50 m derinlikte nem rezervleri şimdiden gözlemlenmeye başlanmıştır.

Ocak ayının ikinci yarısında, tarımsal meteorolojik koşullar önemli bir değişikliğe uğrayacak. Dönem başında beklenen soğuma, kışlık tahıllarda ve kanolada, ülkenin güney bölgeleri de dahil olmak üzere, dormansi (dinlenme) halini yeniden sağlayacaktır. Bu, kış başında görülen olağandışı yüksek sıcaklıkların tetiklediği, tarla bölgelerindeki bazı erken çiçek açan meyve türlerinde erken ve istenmeyen gelişmeyi önleyecektir. Dönem içinde, eksi 10°C'ye kadar düşmesi öngörülen asgari sıcaklıklar, üçüncü yaprak ve kardeşlenme aşamalarında kışlayan kışlık tahıllar ile sonbahar vejetasyonu döneminde bir rozet oluşturmayı başarmış kanola ekili alanları için kritik eşiklerin üzerindedir. Kar örtüsünün olmaması ve daha uzun süreli devam etmesi halinde, bu değerler, vejetasyonu ilk yaprak oluşum aşamasında (1-2 yaprak) sona ermiş geç ekilmiş buğday ve arpa ekili alanları için risk oluşturacaktır.

Dönem içinde, düşük negatif sıcaklıkların görüldüğü alanlarda, suya doymuş sonbahar ekili ürünlerde yüzey toprak tabakasının donması olasılığı artacaktır ki bu, özellikle köklenmesi zayıf, geç ekilmiş kışlık tahıllarda kabarma ve mekanik hasar için bir ön koşuldur. Dönem sonunda, daha ılıman bir hava dalgası ve bağlarda ve meyve bahçelerinde budama işlemlerini yürütme koşullarında bir iyileşme öngörülmektedir.

Takip eden dönem, sebzelerin erken tarla üretimi için fide yetiştiriciliğinde, korumalı yetiştirme tesislerinde tohum ekimi için uygundur. Ekim tarihleri, fide döneminin süresi ve bölgenin iklim özellikleri ile uyumlu hale getirilmelidir. Domates için fide döneminin süresi yaklaşık 80 gün, biber ve patlıcan için ise 75-85 gündür. Fideler, ilgili bölge için olağan geç ilkbahar don tarihlerinden sonra, tarlaya şaşırtmaya uygun aşamaya ulaşmış olmalıdır.