

Mart için Tarımsal Meteorolojik Tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.03.2021 Брой: 3/2021



Mart ayının başlarındaki kısa süreli soğuk havanın ardından, ayın ilk yarısının çoğu gününde agrometeorolojik koşullar, kışlık tahıl ürünlerinin gelişimi için gerekli olan biyolojik minimuma ve iklim normallerine yakın sıcaklıklar tarafından belirlenecek. Bu dönemde, ülkenin güney bölgelerinde sonbaharda ekilen ürünlerde vejetasyonun başlaması için koşullar oluşacak.

İkinci on günlük dönemin ikinci yarısında sıcaklıklarda önemli bir artış ve kışlık tahıl ürünleri ile çok yıllık plantasyonlarda vejetatif süreçlerin aktivasyonu öngörülmüyor.

Üçüncü on günlük dönemde, tarım ürünlerinin gelişimi, normalin üzerindeki termal koşullar altında hızlanarak ilerleyecek. Ayın sonunda, buğday ve arpa çoğunlukla kardeşlenme aşamasında olacak, ülkenin bazı güney ve

güneydoğu bölgelerindeki ekim alanlarında sapa kalkma aşamasına geçiş görülecek. Rozet aşamasında kışı geçiren kışlık kolzada ise kitlesel olarak dallanma gerçekleşecek.

Mart ayında meyve ürünlerinde çeşitli fenolojik aşamalar gözlemlenecek – tomurcuk şişmesi ve patlamasından, erken çiçek açan sert çekirdekli meyve türlerinde (badem, kayısı, şeftali) yeşil salkım ve çiçeklenme aşamalarına kadar – bu durum güney bölgelerde ve Tuna Ovası'nda bazı yerlerde görülecek, zira Şubat ayındaki normalin üzerindeki sıcaklıklar bahçelerde erken gelişmeyi tetikledi.

Mart ayında, eksi 7°C'ye kadar düşmesi öngörülen minimum sıcaklıklar, tomurcuk oluşumu ve çiçeklenme aşamalarındaki en ileri meyve ürünleri için risk oluşturacak.

Mart ayında beklenen ve aylık norma yakın yağışlar, toprak nem rezervlerini iki metrelik katmanda bile artıracak. Şubat ayı sonunda, ekilebilir bölgelerin çoğunda, kışlık tahıl ürünleri altındaki bir metrelik katmanda toprak nem rezervleri tarla kapasitesine yakın seviyelerdeydi. Tuna Ovası'nda bazı yerlerde – Bazovets, Novachene, Pavlikeni agrometeoroloji istasyonları – ve güneydoğu bölgelerde – Sliven, Karnobat, Dolni Chiflik agrometeoroloji istasyonları – buğday altındaki bir metrelik toprak katmanındaki nem rezervlerinin tarla kapasitesinin %90'ının altında olduğu gözlemlendi.

Mart ayında, mevsimlik agroteknik faaliyetlerin yürütülmesi için uygun koşullar – ekim öncesi toprak işleme ve erkenci ile orta erkenci ilkbahar ürünlerinin (fiğ, yulaf, yazlık arpa, bezelye) ekimi; meyve bahçelerinde bir dizi hastalığa karşı (çiçek yanıklığı [erken kahverengi çürüklük], yaprak deliği hastalığı, şeftali yaprak kıvrıcıklığı, kabuklu bit vb.) önleyici çiçeklenme öncesi ilaçlamalar – ayın ilk on günlük döneminin çoğu gününde ve üçüncü on günlük dönemin ikinci yarısında mevcut olacak.

Mart ayının ikinci ve üçüncü on günlük döneminin ilk yarısında öngörülen sık yağışlar, üst toprak katmanlarındaki yüksek nem içeriğini koruyacak ve bu nedenle güney bölgelerdeki bazı yerlerde ayçiçeği ekimi için agroteknik son tarihler kaçırılacak. Güney Bulgaristan'da ayçiçeği ekimi için optimal dönem 15-20 Mart arasında gerçekleşir, Tuna Ovası'nda ise ayın üçüncü on günlük döneminin ortasında (25.03–5.04) başlar.

Kaynak: NIMH