

Nisan ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.04.2021 Брой: 4/2021



Nisan ayının ilk on günlük döneminde, tarımsal meteorolojik koşullar iklim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla belirlenecek. Normallerin üzerinde öngörülen termal koşullar, kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyon süreçlerini hızlandıracak ve tarla alanlarındaki bitki örtüsünün büyük bir kısmı kitlesel olarak sapa kalkma dönemine girecek. Kanolada dallanma ve tomurcuklanma döneminin başlangıcı gözlemlenecek.

On günlük dönemin çoğu gününde önemli yağış beklenmemekte ve ülkenin birçok bölgesindeki koşullar, ekim öncesi toprak işleme ve ayçiçeği ekiminin

yapılmasına imkan sağlayacak. Nisan ayının ilk on günlük dönemi, Kuzey Bulgaristan'da ayçiçeği ekimi için tarımsal teknik son tarihtir.

İlk on günlük dönemin sonu ve ikinci on günlük dönemin başında sıcaklıklarda düşüş, havanın stabilizasyonu ve tarımsal meteorolojik koşullarda önemli bir değişiklik öngörülmektedir. Bu dönemde önemli yağışlar ve toprak nem rezervlerinde, iki metrelik katman dahil olmak üzere, artış beklenmektedir. İlkbaharın başında, tarla alanlarının çoğunda, buğday için bir metrelik katmandaki toprak nem rezervleri tarla kapasitesinin %90'ının üzerine ulaşmıştır. Bazı doğu bölgelerinde – Razgrad, Dolni Chiflik, Sliven tarım istasyonları – istisnalar oluşmakta olup, bu bölgelerde nem rezervleri seviyesi daha düşük, tarla kapasitesinin %80'inin altındadır.

Nisan ayının ilk on günlük döneminin sonu ve ikinci on günlük dönemin başında, meyve bahçelerinde bazı acil bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için kısa süreli bir hava stabilizasyonu ve uygun koşullar öngörülmektedir: yumuşak çekirdekli meyve türlerinde (elma, armut) çiçek tomurcuğu döneminde kabuğa karşı; bazı erken çiçek açan sert çekirdekli meyve türlerinde çiçek yanıklığına (erken kahverengi çürüklük) ve yaprak deliğine karşı çiçeklenme sonrası uygulamalar; kiraz ve vişnede en tehlikeli fungal hastalık olan silindrosporioza (sözde beyaz pas) ve diğerlerine karşı.

Nisan ayının ikinci on günlük döneminde, tarım ürünlerinin gelişimi, normallerin altındaki termal koşullar altında daha yavaş bir tempoda ilerleyecektir. On günlük dönemin sonunda, don oluşma olasılığının artması öngörülmekte olup, bu durum sebze ve tütün fidelerinin sertleştirilmesi sırasında dikkate alınmalıdır. Bazı yerlerde eksi 2–3°C'ye kadar düşmesi öngörülen minimum sıcaklıklar, daha uzun süre devam etmesi halinde meyve ağaçlarının çiçekleri ve genç meyve tutumları için kritik olacaktır.

Üçüncü on günlük dönemin başında ısınma beklenmekte olup, tarla alanlarında on santimetrelik katmandaki toprak sıcaklıkları tane mısır ekimi için uygun değerlere ulaşacaktır.

Üçüncü on günlük dönemde, tarım ürünlerinin vejetasyonu, iklim normallerine yakın sıcaklıklarda orta tempoda ilerleyecektir. Bu dönemde, kışlık tahıl

ürünlerinde sapa kalkmadan başaklanmaya ve başaklanma dönemine geçiş olacaktır. Kanolada ise çiçeklenme dönemi baskın olacaktır.

Nisan ayında sık yağışlar, meyve bahçelerindeki bir dizi fungal hastalığın – çiçek yanıklığı (erken kahverengi çürüklük), kabuk, yaprak deliği, şeftali yaprak kıvrıcıklığı ve diğerleri – enfeksiyon potansiyelinin artması için koşullar yaratacaktır. Meyve ürünlerinde bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için daha uygun koşullar, ilk on günlük dönemin çoğu gününde ve üçüncü on günlük dönemin ilk yarısında oluşacaktır.

Kaynak: NIMH