

Soğanlar için zararlı kontrol sistemi

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2021 Брой: 5/2021



Zararlı – Soğan sineği *Delia antiqua*

Zarar Şekli

Açılan larvalar yaprakların tabanına girerek gövdede bir galeri oyar ve soğanın içine doğru ilerler. Zarar gören bitkiler gelişmede geri kalır, sararır, yatar, kolayca çekilip çıkarılabilir ve sonunda kurur. Zarar sonucu dokular fermente olur ve çürük soğanın hoş olmayan kokusunu yayar.

Mücadele

Sineklerin uçuşunun başlangıcı Nisan ayının ikinci on günlük döneminde beklenir. Bulaşık bitkiler derhal uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. İlk ilaçlama, kütle halindeki uçuş döneminde, vişne çiçeklenmesi ile çakışan zamanda yapılmalıdır. Ekonomik zarar eşiği: *Entomolojik ağ ile 10 süpürmede 5 sinek*.

Zararlı – Tütün thrips *Thrips tabaci*

Zarar Şekli

Thripsler yapraklardan özsu emer ve üzerlerinde beyazımsı lekeler oluşur. Yoğun bulaşma durumunda lekeler birleşir ve tüm yaprak beyaz renk alır. Lekelerin üzerinde küçük siyah noktalar gözlemlenebilir – zararlının dışkısı.

Mücadele

Nisan ayında, tütün thrips ilk görüldüğü andan itibaren, bitki artıklarından veya yabancı otlardan soğana geçtiği zaman dikkat edilmelidir.

Zararlı – Yalancı mildiyö *Peronospora destructor*

Zarar Şekli

Yapraklarda klorotik açık yeşil, eliptik lekeler belirir; bu lekeler nemli havalarda menekşe renkli sporlanma büyümesi ile kaplanır. Enfeksiyon için uygun koşullar, 3–25 °C sıcaklıklarda ve bitkiler üzerinde kalan su damlacıklarının varlığında oluşur.

Mücadele

Gönüllü ve birincil enfekte olmuş bitkilerin imhası. Hastalığın ilk lekeleri tespit edildiğinde vejetasyon ilaçlamaları yapılmalıdır. Kuru hava dönemlerinde ilaçlamalar daha seyrek yapılabilir.

Soğan ekilişlerinde ilaçlama yapılırken bir yayıcı yapıştırıcı eklenmelidir!