

Ağustos ayında toprak nemi açığı, tarımsal ürünlerin gelişimi için sınırlayıcı bir faktör olacaktır.

Автор(и):

Дата: 09.08.2021 Брой: 8/2021



Uzun süren Temmuz sıcaklarının ardından, Ağustos ayının ilk günlerinde agrometeorolojik koşullar kuru ve sıcak hava tarafından belirlenmeye devam edecek. Ayın başında tahmin edilen, 39-40°C'nin üzerindeki son derece yüksek maksimum sıcaklıklar, tarım ürünlerindeki fizyolojik süreçlerin normal seyrini bozacak. Bu düzeydeki değerler, düşük hava nemi ile birleştiğinde, geç tarla üretimindeki sebze bitkilerinde kısırlığa neden olacak.

Ağustos başında, mısır hibrit çeşitlerinin erkenciliğine bağlı olarak süt, balmumu ve tam olum fenofazları gözlenecek. Ayçiçeğinde tohum gelişimi ve olgunlaşma evreleri gerçekleşecek. Asmada tanelerin renklenmesi

ve yumuşaması gözlenecek. Ülkenin birçok bölgesinde, toprak neminin eksikliği nedeniyle koşullar toprak işleme olanaklarını sınırlandıracak. Yabancı ot bitki örtüsünü yok etmek, toprak kılcallarını kırmak ve toprak nemini korumak için buğday ve arpadan boşalan alanlarda anız bozma işleminin yapılması tavsiye edilir. Sebze bitkilerinde ve çok yıllık plantasyonlarda bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için uygun koşullar, günün daha serin saatleri olan sabahları mevcut olacak. Dolu ve tarım ürünlerinde zarar olasılığı da devam etmektedir.

Ağustos ayında, geç tarım ürünlerinin gelişimi için sınırlayıcı faktör toprak nemi açığı olacak. Temmuz sonunda oluşan kuraklık zemininde, ay boyunca normalin altında tahmin edilen yağışların özel bir ekonomik önemi olmayacak, bu da geç tarım ürünleri için artırılmış sulama normlarının uygulanmasını gerektirecektir. Ağustos başında, ikinci ürünlerde ve tanenin oluşup dolduğu geç mısır hibritlerinde, ayrıca meyve büyümesi sürecindeki geç meyve ağacı çeşitleri ve asmalarda daha yüksek sulama normlarına ihtiyaç duyulacaktır.

Ay boyunca normalin üzerinde tahmin edilen termal koşullar, geç tarla bitkilerinin gelişimindeki interfaz dönemlerinin kısalmasına yol açacak. İlk on günlük dönemde, erkenci mısır hibritlerinin bir kısmı gelişimini tamamlayacak ve orta-erkenci olanlarda süt olumu evresi gözlenecektir. Ayçiçeğinde, Tuna Ovası'nda ve güney bölgelerde olgunlaşma evresi gerçekleşecektir. İkinci on günlük dönemin ortasında, tarla alanlarındaki ayçiçeği ekilişlerinin büyük bir kısmı teknik oluma girecektir. Üçüncü on günlük dönemde, orta-geç mısır hibritlerinde balmumu olumu hakim olacak ve soya fasulyesinde olgunlaşma evresi görülecektir.

Ağustos ayındaki meteorolojik koşullar, sebze bitkileri, geç meyve ağacı çeşitleri ve üzümlerdeki külleme hastalıkları hariç olmak üzere, bir dizi fungal hastalığın gelişimini sınırlandıracaktır. Ay boyunca bitki koruma ilaçlamaları, ürünlerin olgunlaşma dönemiyle uyumlu, uygun hasat öncesi aralığa sahip ürünlerle, günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

Ağustos ayında, ülkenin tarla bölgelerindeki birçok yerde kuru ve sıkışmış toprak, kışlık kanola ekimi için ayrılan alanlarda derin sürüm ve ekim öncesi toprak işleminin kaliteli bir şekilde yapılmasını zorlaştıracaktır.

Kaynak: NIMH