

Eylül ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 13.09.2021 Брой: 9/2021



Eylül ayının *ilk on günlük döneminin* çoğu gününde, tarımsal meteorolojik koşullar, yağışlı kararsız hava durumu tarafından belirlenecek ve bu durum, üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerini iyileştirecektir – bu da, hassas bir agroteknoloji gerektiren bir ürün olan kışlık kanola ekimi için ayrılan alanlarda kaliteli bir ekim öncesi toprak işlemesi için bir ön koşuldur. Ağustos sonundaki yaygın yağışlar, bir kısım geç tarla ürünleri için geç kalmıştır; bu ürünler, toprak nemi eksikliği sonucunda gelişimlerini erken tamamlamışlardır.

Eylül başında, derinleşen yaz kuraklığının olumsuz etkilerini atlatmış olan geç mısır hibritlerinin nihai gelişim aşamaları, iklim normlarının civarında ve altındaki sıcaklıklarda ilerleyecektir. İlk on günlük dönemde, orta-geç hibritler balmumu olumu ve tam olum aşamalarına girecektir. Geç hibritlerde ise süt olumu ve balmumu olumuna geçiş aşamaları gerçekleşecektir. On günlük dönemde tahmin edilen sık yağışlar, belirli mantar hastalıklarının

gelişme riskini artıracaktır – olgunlaşan üzüm hasadında kurşuni küf ve meyve ağaçlarının meyvelerinde geç yanıklık çürüklüğü.

İkinci on günlük dönemde, tarımsal meteorolojik koşullar bir değişim geçirecektir. On günlük dönemin çoğu gününde beklenen güneşli ve ılık hava, meyve ağaçlarının sonbahar çeşitlerinin meyvelerinde daha fazla şekerin sentezlenmesi ve birikmesini destekleyecektir. Eylül ortasına kadar, geç mısır hibritleri gelişimlerini tamamlayacak ve çeltikte balmumu olumu ve tam olum gözlemlenecektir.

Bu dönemde önemli yağış tahmin edilmemekte olup, koşullar ayçiçeği ve daha erkenci mısır hibritlerinden alanların temizlenmesi ve kışlık kanola ekiminin yapılması için uygun olacaktır.

Koşullar, mevsimlik toprak işleme – derin sürüm, kışlık kanola ve kışlık tahıl ürünleri ekimi için ayrılan tarlalarda ekim öncesi toprak hazırlığı – yapılması için uygun olacaktır. Dönem, sonbahar ekimi için ayrılan buğday ve arpa tohumluğunun hazırlanması – tohum kaynaklı fitopatojenlere, sürme ve راستیға, septoria yaprak lekesi ve fusarium hastalıklarına karşı tohumluk materyalin dezenfeksiyonu ve ilaçlanması – için uygundur.

Eylül ayının *üçüncü on günlük döneminde*, yaz sonu ve sonbahar başı için tipik olan, daha düşük minimum sıcaklıklarla seyreden geçişsel tarımsal meteorolojik koşul değişimleri gözlemlenecektir. On günlük dönemin ikinci yarısında, yüksek arazilerde yer donları beklenmektedir; bu durum, dona hassas sebze ürünlerinin (domates, biber) hasadı sırasında dikkate alınmalıdır.

Sonbahar başında tahmin edilen yağışlar, kışlık kanolanın ilk vejetasyon aşamalarının normal seyri için nem sağlayacaktır. Eylül sonunda, agroteknik zaman dilimi içinde ekilmiş ürünlerin bir kısmında çıkış aşaması gözlemlenecektir. Çıkış aşamasında, kanolaya lahana gövdeli pire böceği (ergin bireyler) ve şalgam testereli arısı (yalancı tırtıllar) zarar vermekte olup, bu durum çıkan ürünlerin izlenmesini ve zararlı yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğini (lahana gövdeli pire böceği için EZE – m²'de 2 böcek; şalgam testereli arısı için EZE – m²'de 2–3 yalancı tırtıl) aşması durumunda zamanında mücadele yapılmasını gerektirmektedir.

Kaynak: NIMH