

Meyve Bahçesinde

Автор(и): проф. Мария Боровинова

Дата: 01.02.2015 Брой: 2/2015



Şubat ayının sıcak günlerinde ve Mart ayının ilk yarısında, kışlayan stoklara karşı ilaçlama yapılmalıdır: Avrupa kırmızı akarı, kahverengi elma akarı, yeşil elma yaprakbiti, pembe elma yaprakbiti, elma-çimen yaprakbiti, armut-yatak otu yaprakbiti, armut-öksürük otu yaprakbiti, kiraz siyah yaprakbiti, unlu erik yaprakbiti, yeşil şeftali yaprakbiti, yaprak kıvrıcık yaprakbiti, büyük şeftali yaprakbiti, küçük ve büyük erik yaprakbiti, küçük kış kelebeği, büyük kış kelebeği, gül yaprak bükeni, alıç yaprak bükeni, kahverengi benekli yaprak bükeninin **yumurtaları**; San Jose kabuklubiti, sarı armut kabuklubiti, sahte San Jose kabuklubiti, virgül kabuklubiti larvaları. Elma, armut, kiraz, vişne, kayısı, şeftali ve erikteki bu zararlılara karşı Para Zomer – %3 kullanılır. Şeftali yaprak kıvrıcıklığı, armut ve şeftali kabuğu lekesi, sert çekirdekli meyvelerde delikli yaprak lekesi ve kahverengi çürüklük, *Pseudomonas syringae*'nin neden olduğu kiraz, vişne ve kayısıda bakteriyel kanser (sakız hastalığı) ve erikte şarka (plum pox) hastalığının eşzamanlı kontrolü için, bakır

іçeren fungusitlerden biri Para Zomer'a eklenir - Bordo bulamacı-%1, Funguran OH 50WP-%0.3, Champion WP- %0.3, Kocide 101 WP-%0.3.

Armut ağaçlarında, armut psyllid'inin (*Cacopsylla pyri*) gelişimi, özellikle kış barınaklarından çıkışları ve kışlamış erginlerin şişen tomurcuklara dağılarak öz suyu emmeye başlamaları izlenmelidir. Psyllid yoğunluğunun yüksek olduğu durumlarda (10 çuvala alınmış dalda 1 birey), yumurta bırakmadan önce ergin bireylere karşı ilaçlama gereklidir. Çoğu zaman bu zararlıya karşı yapılan mücadele, kış ilaçlaması ile çakışır ve bu durumda Para Zomer'a aşağıdaki insektisitlerden biri eklenir: Vaztak Nov 100 EC – %0.02, Decis 2.5 EC – %0.03, Deca EC – 75 ml/da, Sumicidin 5EC – %0.03. Kiraz ve vişne ağaçlarında bu dönemde, kiraz hortumlu böceği yoğunluğunu belirlemek için bir silkme testi yapılır ve eğer ağaç başına 3 ergin bulunursa, Nurelle D/Sanmba/ – %0.08 ile ilaçlama yapılır.

Resimde: Şeftali yaprak kıvrıcıklığı