

Kasım, meyve ağaçları dikmek için uygundur

Автор(и):

Дата: 17.11.2021 Брой: 11/2021



Bu yıl, sonbahar başındaki olumsuz agrometeorolojik koşullar, uzun süren kuraklık ve ardından Ekim ayında normalin üzerinde seyreden yağışlar, mevsimlik toprak işleme faaliyetlerinin uygulanmasını engelledi. Ülkenin çoğu bölgesinde, bu objektif nedenlerden dolayı, kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için belirlenen agroteknik zamanlamalar kaçırıldı.

Kasım ayında agrometeorolojik koşullar, iklim normalleri civarında ve üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışlarla belirlenecek.

Kasım ayı başında, sıcaklıklarda önemli bir artış ve ekilen sonbahar ürünlerinde vejetatif süreçlerin canlanması bekleniyor. Ayın ilk on günlük döneminin ortasına kadar, tarla alanlarının çoğunda koşullar, ekim öncesi toprak

hazırlığı ve sonbahar ürünlerinin ekiminin yapılmasına izin verecek. Trakya Ovası'ndaki bazı yerlerde istisnalar olacak; bu bölgelerde Ekim ayı yağışları aylık normalleri üç ila dört kat aşmıştır (Plovdiv-152l/m², Pazardzhik-160l/m², Haskovo-181l/m², Stara Zagora-150l/m², Çırpan-151l/m²), bu da 50 cm'lik toprak katmanının aşırı nemlenmesine yol açmıştır.

Kasım ayının ilk haftasının sonunda, agrometeorolojik koşullar bir değişim geçirecek. Ayın ortasına kadar, bu koşullar kararsız hava durumu tarafından belirlenecek. Bu dönemde beklenen yağışlar, sonbahar ekimlerinin tamamlanmasını geciktirecek. Geç ekilen Kasım ürünlerinin, sonbahar vejetasyon döneminin sonuna kadar kışa uygun faz olan kardeşlenme aşamasına ulaşamama olasılığı yüksektir.

Dönem boyunca önemli miktarda yağış öngörülmemekte olup, koşullar mevsimlik agroteknik faaliyetlerin – derin sürüm ve ekim öncesi toprak hazırlığı – yürütülmesi ve kışlık tahıl ürünlerinin ekiminin tamamlanması için uygun olacak. Koşullar, çok yıllık plantasyonlarda fitosaniter önlemlerin uygulanmasına ve etkilenen meyve ağaçlarında kabarcık, beyaz pas, yaprak kıvrıcıklığı vb. hastalıklara karşı ilaçlama yapılmasına imkan sağlayacak. Bu dönem, genç meyve ağaçlarının dikimi için uygundur.

Kasım ayının ikinci yarısında, normaller civarında ve üzerinde seyretmesi öngörülen ortalama günlük sıcaklıklar, sonbahar ürünlerindeki aktif vejetatif süreçleri sürdürecektir. Kasım ayı sonunda, buğdayda ekim tarihlerine bağlı olarak farklı gelişim aşamaları gözlemlenecek. Çimlenme aşaması ve ilk yaprak oluşumu, Kasım ayında ekilen ürünlerde görülecek. Üçüncü yaprak aşaması, Ekim ayının üçüncü on günlük döneminde ekilen ürünlerde hakim olacak. Sonbahar başında ekilen az sayıdaki kışlık tahıl ürünlerinde ise, Tuna Ovası'ndaki bazı yerlerde (agrometeoroloji istasyonları Novachene, Pavlikeni) kardeşlenme aşaması gözlemlenecek.

Kasım ayında, normaller civarında ve üzerinde seyretmesi öngörülen yağışlar, daha derin toprak katmanlarındaki sonbahar nem rezervlerini de artıracak. Ekim ayı sonunda, tarla alanlarının çoğunda, 50 cm ve 100 cm'lik toprak katmanlarındaki nem rezervleri, tarla kapasitesinin %85-90'ının üzerinde seviyelerdeydi.

Ay boyunca, meyve ağaçlarının dikimi ve meyve bahçelerinde fitosaniter faaliyetlerin yürütülmesi için uygun koşullar, Kasım ayının başında ve ikinci yarısının çoğu gününde oluşacak.

Kaynak: NIMH