

Aralık – tarımsal meteorolojik koşullarda artan dinamikler

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.12.2021 *Брой:* 12/2021



Kasım ayındaki normalin üzerindeki sıcaklıklar ve iyi toprak nem rezervlerinin varlığı, güz ekimli ürünlerde aktif vejetatif süreçleri sürdürdü ve geç ekilen bitki örtüsünün gelişiminde ilerleme için koşullar sağladı.

Aralık ayının ilk on günlük döneminde, tarımsal meteorolojik koşullar oldukça dinamik olacak, kısa süreli normal altı ve normal üstü ortalama günlük sıcaklık dönemleri birbirini takip edecek, ancak sıcaklıklar kışlık tahıl ürünlerinin gelişimi için gerekli biyolojik minimumun altında kalacaktır. Ayın başında buğday ve arpada büyümenin yavaşlaması gözlemlenecek ve ilk on günlük dönemin ikinci yarısında, kar dahil yağışların beklendiği dönemde, ülkenin çoğu bölgesinde bitki örtüsündeki vejetasyon duracaktır. İstisnalar, aşırı güney bölgelerdeki ve

Karadeniz kıyısı boyunca izole yerlerde meydana gelecek, burada güz ekimli ürünlerde zayıf bir şekilde ifade edilen vejetatif süreçler devam edecek, ancak bunlar fenolojik aşamalarında bir değişikliğe yol açmayacaktır.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerde, iklim normlarına yakın seyretmesi öngörülen sıcaklıklar, kışlık tahıl ürünlerini dormansi (dinlenme) halinde tutacaktır.

Kışın başlangıcında, buğdayda hakim aşama üçüncü yaprak aşaması olacaktır. Tuna Ovası'nın bazı bölgelerinde ve ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde, agroteknik zaman dilimi içinde ekilen bitki örtüsünün küçük bir kısmı, kışı geçirmek için uygun aşama olan kardeşlenme aşamasında olacaktır. Kasım ortasında ekilen geç ekimli kışlık tahıl ürünleri ise çıkış aşamasında ve ilk yaprak oluşum aşamasındadır. Bitki örtüsünün fenolojik durumundaki önemli farklılıkların nesnel nedeni, sonbahar başındaki olumsuz koşullar (kuraklık ve ardından gelen normalin üzerindeki Ekim yağışları) nedeniyle yapılan geç ekimlerdir.

Aralık ayında, kar örtüsü olmayan ve daha uzun süreli koşullarda eksi 12°C'ye kadar düşmesi öngörülen minimum sıcaklıklar, çıkış ve ilk yaprak oluşum aşamalarındaki sertleşmemiş kışlık tahıl ürünleri için kritik olacaktır.

Ay boyunca beklenen normalin üzerindeki yağışlar, 100 cm toprak katmanındaki toprak nem rezervlerini artıracak ve güney bölgelerdeki birçok yerde tarla kapasitesine yakın seviyelere ulaşacaktır.

Kaynak: NIMH