

Осак – meyve bitkilerinde kış budaması için uygun koşullar

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.01.2022 Брой: 1/2022



2022 yılının Ocak ayı başında, agrometeorolojik koşullar, mevsime göre yüksek sıcaklıklar ve ülkenin ekilebilir alanlarının çoğunda, kışlık tahıl ürünlerinde vejetatif süreçlerin yeniden başlaması için gerekli biyolojik minimuma yakın ortalama günlük değerlerle belirlenecektir. En güney ve güneydoğu bölgelerde, sonbaharda ekilen ürünlerde zayıf bir şekilde ifade edilen bir vejetasyon için koşullar oluşacak, ancak bu, ürünlerin fenolojik durumunda bir değişikliğe yol açmayacaktır. Buğday ve arpa ekili alanları kışa farklı büyüme aşamalarında girmiştir. Sonbahar sonunda Buzovets, Nikolaevo, Kazanlak, Kyustendil, Chirpan, Haskovo ve Sliven agrometeoroloji istasyonlarında ekilen geç ekilen kışlık tahıl ürünleri çıkış aşamasındadır. Kneja, Targovişte ve Pazardzhik'ta Kasım ayında ekilen alanlarda üçüncü yaprak aşaması hakimdir. Kışlamak için uygun aşama olan

kardeşlenme aşamasında, Novachene, Pavlikeni, Plovdiv, Lyubimets, Yambol, Provadia, D. Chiflik ve Karnobat agrometeoroloji istasyonlarında agroteknik dönem içinde ekilen sonbahar ekimli ürünler bulunmaktadır. Ocak ayının ilk haftasının sonunda, agrometeorolojik koşullar bir değişikliğe uğrayacaktır. Beklenen soğuma, ekili alanların çamurlaşmasına ve kışa dayanıklılıklarının azalmasına yol açacak olan kışlık tahıl ürünlerinin istenmeyen vejetasyonunu engelleyecektir.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemler boyunca, agrometeorolojik koşullar iklim normlarına yakın sıcaklıklarla belirlenecek ve sonbaharda ekilen ekili alanları dinlenme halinde tutacaktır. Ay boyunca, kar örtüsü olmayan koşullarda ve daha uzun süreli kalıcılıkla, eksi 10-15°C arasındaki tahmin edilen minimum sıcaklıklar, geç ekilen ekili alanlar için kış zararı riski oluşturacaktır. Eksi 10°C'nin altındaki değerler çıkış aşamasındaki kışlık tahıl ürünleri için kritiktir ve eksi 13°C'nin altındaki değerler de üçüncü yaprak aşamasındakiler için kritiktir.

Ocak ayında ay için beklenen normale yakın yağışlar, bir metre ve iki metre katmanlardaki toprak nem rezervlerini artıracaktır. Aralık ayı sonunda, ekilebilir alanların çoğunda buğday için bir metre toprak katmanındaki toprak nem rezervleri tarla kapasitesinin %90'ının üzerindeydi.

Ocak ayında, meyve ürünlerinin kış budamasını yapmak için daha uygun koşullar, ikinci on günlük dönemin sonunda ve üçüncü on günlük dönemin çoğu gününde ortaya çıkacaktır.

Kaynak: NIMH