

Mayıs Ayı İçin Tarımsal Meteorolojik Tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.05.2022 Брой: 5/2022



Mayıs ayının ilk on günlük döneminde, tarım ürünlerinin gelişimi daha yavaş bir seyirde ilerleyecek olup, günlük ortalama sıcaklıklar iklim normallerinin altında seyredecektir. Ayın başında, yüksek havza tarlalarında don oluşma ihtimali göz ardı edilemez; bu durum, sebze fidelerinin dikimi sırasında dikkate alınmalıdır.

İlkbahar başı için alışılmadık derecede kurak koşulların ardından, Nisan ayının ikinci yarısında gerçekleşen ve ülkenin birçok bölgesinde 50-60 l/m²'yi aşan yağışlar, sonbaharda ekilen ürünlerdeki toprak nem açığının giderilmesine katkıda bulunmuştur. Mayıs ayının ilk on günlük döneminde öngörülen yağışlar, 50 cm'lik toprak katmanında iyi seviyelerdeki toprak nem rezervlerini – tarla kapasitesinin %75-80'inin üzerinde – koruyacaktır. Bu yağışlar, toprak nemi için artan gereksinimleri olan ve üreme gelişim aşamasındaki kışlık tahıl ürünleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. İlk on günlük dönemde, buğday, sap uzama aşamasından

başaklanmaya geçiş sürecini geçirecek ve Tuna Ovası ile en güney bölgelerdeki bazı ekim alanlarında başaklanma başlayacaktır.

İkinci on günlük dönemin ilk yarısında mevsime göre serin geçen havanın ardından, termal koşulların normale dönmesi ve tarım ürünlerindeki vejetatif süreçlerin hızlanması ile bir iyileşme öngörülmektedir.

Mayıs ayının ikinci yarısının çoğu gününde, kışlık tahılların ve ekilen ilkbahar ürünlerinin gelişimi, normalin üzerindeki sıcaklıklar altında hızlanmış bir tempoda ilerleyecektir. Mısır ve ayçiçeğinde yaprak oluşumu gerçekleşecektir. Mayıs sonunda, agroteknik zaman dilimi içinde ekilen ayçiçeğinde çiçeklenme başlangıcı gözlemlenecektir.

Üçüncü on günlük dönemde, ekonomik öneme sahip yağışlar beklenmektedir. Bu yağışlar, tanenin oluşumu ve dolumunun gerçekleşeceği kışlık tahıl ürünlerinin artan su ihtiyacını karşılayacaktır. Bu dönemde, dolu yağışı olasılığı ve tarım ürünlerinde zarar riski öngörülmektedir. Doldan etkilenen meyve ve sebze ürünleri için, yara iyileşmesini hızlandırmak ve ikincil enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla, ilk fırsatta bakır içeren fungisitlerle bir uygulama yapılması önerilir.

Mayıs ayındaki sık yağışlar, bir dizi fungal hastalığın enfeksiyon zemininin artması için bir ön koşul olacaktır: buğdayda pas hastalıkları (kahverengi, kara ve sarı pas), septoria yaprak lekesi ve fusarium; sebze ürünlerinde ve asmalarda mildiyö; sert çekirdekli meyve türlerinde çiçek yanıklığı (erken kahverengi çürüklük) ve yaprak deliği hastalığı; ve yumuşak çekirdekli meyve türlerinde karaleke.

Bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için daha uygun koşullar, yağış olasılığının düşük olduğunun öngörüldüğü Mayıs ayının ikinci on günlük döneminde ortaya çıkacaktır.

Kaynak: NIMH