

'Sadovo bölgesindeki buğday mahsulünün durumu'

Автор(и): доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

Дата: 06.06.2022 Брой: 6/2022



03.06.2022 itibarıyla, Sadovo bölgesindeki buğday ekimlerinin fitosaniter durumu **özellikle iyi olmayan** olarak tanımlanabilir. Mayıs ayı boyunca yağış miktarı yeterli olmamış ve bu dönemde fizyolojik süreçlerin normal seyri için gerekli olan toprak neminde eksiklik gözlemlenmiştir.



Mayıs sonu toprak durumu

Haziran başında, buğday bitkileri "süt olumu sonu - balmumu olumu başlangıcı" evresine girmiştir. Ekonomik zarar eşiğinin (EZE) üzerinde fitopatojen gelişimi kaydedilmemiştir. Septoria, külleme ve sarı pas hafif enfestasyonu gözlemlenmiştir.



Külleme



Sarı pas

Yeterli nemin olmaması, bahsi geçen fitopatojenlerin gelişmesine ve çoğalmasına izin vermemiştir. Külleme, esas olarak bitkinin alt yapraklarında bulunur; püstüller küçüktür ve miselyum yaşlanma sürecindedir. Septoria ve sarı pas, izole ve gözle görülür şekilde zayıflamış bitkilerde veya geç kardeşlerde görülür. Zararlılardan buğday yaprak böceği, yaprak bitleri ve buğday tripsi'nin düşük ve EZE altında bir insidansı kaydedilmiştir. Hafif sekonder yabancı ot enfestasyonu da gözlemlenmektedir.



Dolu zararı

Mayıs sonunda düşen dolu, buğday ekimlerinin durumunu önemli ölçüde kötüleştirmiştir. Başakçıkların dağılması, bitkilerde kırılma ve yatma kaydedilmiştir. Tüm bunlar, planlanan verim üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacak ve yaklaşık %20-30'luk bir çıktı azalması beklenmektedir.



Dolu zararı