

Temmuz – tarımsal ürünlerin gelişimi hızlanacak

Автор(и): Растителна защита
Дата: 10.07.2022 Брой: 7/2022



Temmuz başında tarımsal ürünlerin gelişimi, normalin üzerindeki sıcaklıklar altında ve ülkenin çoğu bölgesinde, normalin üzerindeki Haziran yağışlarının bir sonucu olarak 50 ve 100 cm toprak katmanında iyi nem rezervleriyle ilerleyecektir. Bu yağışlar birçok yerde 80-100 l/m²'yi aşmıştır (Vratsa – 169 l/m², Montana – 91 l/m², Shumen – 113 l/m², Sofya – 153 l/m², Plovdiv – 110 l/m², Sliven – 98 l/m², Burgas – 95 l/m²).

Ayın ilk günlerindeki sıcak havanın ardından, ilk on günün sonunda ve ikinci on günün başında termal koşulların normale dönmesi öngörülmektedir. Bu dönemde, tarımsal açıdan önemli yağışlar beklenmekte olup, bu yağışlar 50 cm katmandaki toprak nem rezervlerinin iyi seviyelerde (tarla kapasitesinin %75'inin üzerinde) kalmasını sağlayacaktır. Bu yağışlar, gelişimlerinin üreme aşamasında olan ve toprak nemi için yüksek gereksinimlere sahip olan mısır ve ayçiçeği için önemli ölçüde önem taşıyacaktır (mısırdaki, tepe püskülü çıkarma ile süt olumu

dönemleri arasında günlük su tüketimi 6-7 m³/dekara ulaşır). Temmuz ortasına kadar, ilkbahar ürünlerinin vejetasyonu, normale yakın termal koşullar altında orta hızlarda ilerleyecektir. Mısırdaki, erkencilik derecesine bağlı olarak farklı gelişim aşamaları gözlenecektir: yaprak oluşumu, tepe püskülü çıkarma, tepe püskülü çiçeklenmesi ve koçan püskülü çıkarma. Tarlalardaki ayçiçeğinde çiçeklenme aşaması hakim olurken, yüksek alanlardaki ekimlerde ise çiçeklenme öncesi tomurcuk oluşumu aşaması görülecektir.

Temmuz ayının ikinci yarısının çoğu gününde, tarımsal ürünlerin gelişimi, iklim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar altında hızlanmış bir tempoda ilerleyecektir. Üçüncü on günün başında, tarla alanlarındaki erkenci mısır hibritlerinin bir kısmı süt olumu aşamasına girecektir. Ayçiçeğinde ise tohum oluşumu ve dolumu gerçekleşecektir. Ay sonunda, tarımsal teknik zaman dilimi içinde ekilmiş ayçiçeği ekimlerinde, Tuna Ovası'ndaki (Büzovets, Knezha, Novachene tarımsal meteoroloji istasyonları) ve güneydoğu bölgelerindeki bazı yerlerde, olgunlaşma aşamasının başlangıcı gözlenecektir.

Üçüncü on gün boyunca öngörülen kurak, ılık ve sıcak hava, sebze ürünleri, meyve ağaçları ve asmalardaki külleme hastalıkları hariç olmak üzere bir dizi fungal hastalığın gelişimini sınırlandıracaktır. Meyve ürünlerinde, hastalıklara karşı bitki koruma uygulamalarının, meyve güvelerinin ikinci nesline karşı mücadele ile birleştirilmesi; asmalarda ise bağ güvesinin ikinci nesil larvalarına karşı mücadele ile birleştirilmesi tavsiye edilir. Bitki koruma ilaçlamalarını gerçekleştirmek için uygun koşullar Temmuz başında, ikinci on günün ikinci yarısında ve üçüncü on günün çoğu gününde mevcut olacaktır. Hastalık ve zararlılara karşı ilaçlamalar, günün daha serin saatlerinde, ürünlerin olgunlaşma dönemiyle uyumlu, uygun hasat öncesi bekleme süresine sahip ürünler kullanılarak yapılmalıdır.

Kaynak: NIMH