

Eylül sonu ve Ekim başında, hasat edilmemiş üründe çürümeye neden olan patojenlerin gelişimi için koşullar uygun olacaktır.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 25.09.2022 Брой: 9/2022



Eylül ayında, güney bölgelerin bazı yerlerinde (Haskovo, Pazardzhik, Chirpan, Karnobat, Plovdiv, Sandanski, Sliven, Burgas) 15–20 l/m² arasında ekonomik açıdan önemli yağışlar düştü ve agroteknik zaman dilimi içinde ekilen kış kolzasının çıkışı için gerekli nemi sağladı.

Ayın sonunda agrometeorolojik koşullarda bir iyileşme öngörülmektedir. Dönem boyunca, geç mısır hibritleri gelişimlerini tamamlayacak ve tam olgunluğa girecektir. Geç meyve ağacı çeşitlerinde ve bağlarda olgunlaşma süreçleri, iklim normalleri civarındaki sıcaklıklarda ilerleyecektir.

Dönem boyunca önemli bir yağış beklenmemekte olup, koşullar geç ilkbahar ürünlerinin hasadının tamamlanmasına, buğday ve arpa ekimi için ayrılan alanlarda ekim öncesi toprak işlemenin yapılmasına ve mineral gübre uygulamasına imkan verecektir. Dönem boyunca, yüksek tarlalarda ve Ön-Balkan'da kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için agroteknik zaman dilimi başlamaktadır. Eylül sonuna kadar, koşullar kış kolzası ekimindeki gecikmelerin üstesinden gelinmesine izin verecektir. Dönem, ıspanak için sonbahar ekimi ve yeni çilek plantasyonlarının kurulması için uygundur.

Dönemin başında, havza tarlarındaki izole yerlerde, don oluşma ihtimali dışlanamaz; bu da dona hassas ürünlerin zamanında hasat edilmesini gerektirir.

Ekim ayının ilk haftasında agrometeorolojik koşullar kararsız hava durumu tarafından belirlenecek, dönemin ikinci yarısında ise - ayrıca normalin altındaki sıcaklıklar tarafından belirlenecektir. Ekim ayının ilk haftasında öngörülen yağışlar, geç sıra ürünlerinden alanların temizlenmesini geciktirecektir. İlk on günlük dönemin ortasındaki yağışlı ve serin hava, geç şarap üzümü çeşitlerinin henüz hasat edilmemiş ürününde çürüklüğe neden olan patojenlerin - gri küfün ve sonbahar-kış meyve ağacı çeşitlerinin meyvelerinde geç kahverengi çürüklüğün gelişimi için bir ön koşul olacaktır.

Eylül sonunda kuzeybatı bölgelerde, kuzeydoğu bölgelerin bir kısmında ve Sofya ovasında düşen, 20–30 l/m² aralığındaki (N. selo, Vidin, Lom, Oryahovo, Sofya, V. Tarnovo, Dobriç) yağışlar, üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerini artırdı. Takip eden dönemde, Batı Bulgaristan ve merkezi bölgelerde yeniden yerel, yoğun yağış olasılığı öngörülmekte olup, bu da sonbahar ürünleri ekimi için ayrılan alanlarda ekim öncesi toprak işlemenin uygulanmasını engelleyecektir. Kış kolzası ekiminde ciddi gecikmeler beklenmektedir. Yaz sonu ve sonbahar başındaki olumsuz agrometeorolojik koşullar, kuraklık ve sonrasındaki yoğun yağışlar, birçok ovak bölgesinde, hassas tarım gerektiren bir ürün olan kolza ekimi için Eylül ayındaki agroteknik zaman dilimlerinin kaçırılmasının nedenidir. Ekim ayının başında, Kuzey Bulgaristan'da buğday ekimi için agroteknik zaman dilimi başlamaktadır.

Kaynak: NIMH