

Ekim ayı için tarımsal meteorolojik tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2022 Брой: 10/2022



Ekim ayında tarımsal meteorolojik koşullar dinamik olacak, sıcaklıklar iklim normallerine yakın ve yağışlar aylık normallerin üzerinde seyredecek.

Ekim ayının ilk günlerinde mevsime göre alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar öngörülmekte olup, bu durum geç sebze mahsullerinden ek verim oluşmasına, ayrıca meyve ağaçlarının sonbahar çeşitlerinde ve geç şaraplık üzüm çeşitlerinde meyvelerin şeker içeriğinin artmasına elverişli koşullar yaratacaktır.

Normallerin üzerindeki bu sıcaklıkların ardından, ilk on günlük dönemin ikinci yarısında kısa süreli bir soğuma ve termal koşulların normale dönmesi beklenmektedir.

Ekim ayının ilk on günlük döneminde önemli miktarda yağış beklenmekte olup, bu durum mevsimlik tarımsal teknik faaliyetleri daha da zorlaştıracaktır. Tohum öncesi toprak işleme ve kışlık mahsul ekimi için daha iyi koşulların, ikinci on günlük dönemin ilk yarısında ve üçüncü on günlük dönemin çoğu gününde oluşması beklenmektedir.

Yaz sonu ve sonbahar başında yaşanan kuraklık ve ardından gelen yer yer şiddetli yağışlar, kışlık kanolanın Eylül ayındaki optimal ekim tarihlerinin kaçırılmasının nedeni oldu. Planlanan alanların önemli bir kısmı, tarımsal teknik son tarihlerden sonra, Ekim ayında ekilecek. Bu objektif nedenlerden dolayı, geç ekilen kanola bitkilerinin sonbahar vejetasyon döneminde başarılı bir şekilde kışlayabildikleri faz olan bir rozet (7–8 yaprak) oluşturmama olasılığı bulunmaktadır.

Ekim ayı, kışlık tahıl mahsullerinin ekimi için optimal dönemdir. İlk on günlük dönem, Kuzey Bulgaristan'da buğday ekimi için tarımsal teknik son tarihtir; 15-25 Ekim tarihleri Güney Bulgaristan için, ayın sonu ise Karadeniz kıyısındaki bölgeler için geçerlidir.

Ay boyunca, ekilen kışlık mahsullerin vejetasyonunun ilk aşamaları, üst toprak katmanlarında yeterli nem rezervlerinin bulunması sayesinde orta düzeyde ilerleyecektir. Ekim ayı sonunda, buğdayda ekim tarihlerine bağlı olarak çıkış ve üçüncü yaprak aşamaları gözlemlenecektir. En erken ekilen tarlalarda, Eylül sonu ve Ekim başında, kardeşlenme aşamasının başlangıcı da görülecektir. Kanolada ise yaprak oluşumu ağırlıkta olacaktır.

Ekim ayında normallere yakın olması öngörülen termal koşullar, kışlık mahsullerdeki tehlikeli zararlılardan biri olan tarla faresinin popülasyonunda artış için bir ön koşuldur. Ay sonuna kadar kışlık tarlalar zararlıının varlığı açısından kontrol edilmeli ve yoğunluğu ekonomik zarar eşiğini (dekarda 2 aktif koloni) aşarsa, zamanında bitki koruma önlemleri alınmalıdır (koloni girişlerine yerleştirilen zehirli yemler).

Ekim ayı sonunda, meyve bahçelerinde belirli fitosaniter faaliyetlerin yürütülmesine imkan sağlayacak koşullar oluşacaktır. Elma ve armut bahçelerinde, hasattan sonra, yaprak lekesi (kabarcık) hastalığından etkilenen ağaçlara enfeksiyonu azaltmak için %5'lik üre çözeltisi uygulanmalıdır. Sert çekirdekli meyve türlerinde ise, kitlesel yaprak dökümünden sonra, delikli yaprak lekesi, erken kahverengi çürüklük ve şeftali yaprak kıvrıcıklığı etmenlerine karşı %2'lik Bordo bulamacı ile ilaçlama önerilmektedir.

Kaynak: NIMH (Ulusal Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü)

