

Kasım Ayı İçin Tarımsal Meteorolojik Tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.11.2022 Брой: 11/2022



Kasım ayının ilk yarısında tarımsal meteorolojik koşullar, kuru hava ve iklim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla belirlenecek. Ayın ortasına kadar ekilen sonbahar ürünlerinin gelişimi için sınırlayıcı faktör, toprak nemi açığı olmaya devam edecek. Güney ve güneydoğu bölgelerinin bazı kısımlarında (Karnobat tarımsal meteoroloji istasyonu) oluşan kuraklık, filizlenmiş ve çıkmış ürünlerin bir kısmının hayatta kalmasını şüpheli hale getirecek.

Ekim sonunda, 50 ve 100 cm katmandaki toprak nem rezervleri seviyesi olağandışı derecede düşüktü, Güney Bulgaristan'ın birçok yerinde – tarla kapasitesinin %40'ının altında (tarımsal meteoroloji istasyonları: Filibe, Pazarcık, Sliven). Güneydoğu bölgelerinin bazı kısımlarında (Karnobat tarımsal meteoroloji istasyonu) tüm bir metrelik toprak katmanında nem yoktu.

Kasım başında, kuraklık mevsimsel toprak işlemlerinin uygulanmasını sınırlandıracak ve tarla alanlarının bir kısmında kışlık tahıl ürünlerinin ekimini tarımsal teknik takvimin ötesine erteleyecek.

Kasım ayının ikinci yarısında, tarımsal meteorolojik koşullar bir değişim geçirecek. İkinci on günün ortasından üçüncü on günün ortasına kadar yağışların yanı sıra, üst katmanlarda toprak nem rezervlerinde ve ekilen sonbahar ürünlerinin ilk vejetasyon aşamalarının ilerlemesi için koşullarda bir iyileşme öngörülmektedir. Bu dönemde, kışlık tahıl ürünlerinin gelişimi, ayın ikinci yarısı için iklim normallarına yakın ortalama günlük sıcaklıklarda gerçekleşecek.

Kasım sonunda, buğday ve arpa çıkış ve 1., 2. ve 3. yaprak oluşumu fazlarında olacak. Tuna ovası bölgelerindeki belirli yerlerdeki (tarımsal meteoroloji istasyonları: Bazovets, Novachene, Rusçuk bölgesi) ürünlerin küçük bir kısmında, sonbahar başındaki yerel yağışlar kışlık tahıl ürünlerinin ilk vejetasyonu için nem sağladığından, kardeşlenme fazı da gözlemlenecek.

Ay boyunca çıkmış sonbahar ürünleri için kritik minimum sıcaklıklar öngörülmemektedir. Kasım başında, zararlılar – buğday yaprak galeri sineği, tahıl sinekleri – varlığı için ürünlerin kontrolüne devam edilmeli ve yoğunluklarının ekonomik zarar eşiğini aştığı yerlerde (tahıl sinekleri için EZE 3–4 adet/m², buğday yaprak galeri sineği için – 3'ten fazla larva/m²) zamanında mücadele yapılmalıdır.

Elma kabuğu, erken kahverengi çürüklük, yaprak deliği hastalığı, şeftali yaprak kıvrıcıklığı ve diğer kışlayan patojenlerin enfeksiyonlarını sınırlamak için meyve bahçelerinde sonbahar bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için uygun koşullar Kasım ayının ilk yarısında, meyve ağaçlarının dikilmesi için ise üçüncü on günlük dönemde oluşacak.

Kaynak: NIMH