

Aralık – çok yıllık bitkilerdeki fitosaniter faaliyetlere dikkat edin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2022 Брой: 12/2022



Aralık ayının çoğu gününde, agro-meteorolojik koşullar, ortalama günlük sıcaklıkların iklim normalleri etrafında, altında ve üzerinde kısa dönemler halinde değiştiği dinamik hava durumu tarafından belirlenecektir.

Ayın başında, üst toprak katmanlarındaki artan nem içeriği, mevsimlik toprak işleme faaliyetlerinin uygulanmasını sınırlandıracaktır. Dönemin ortasında yağış beklenmemekte olup, bu da kalıcı bitkilerde fitosaniter faaliyetlerin yürütülmesi için bir fırsat sağlayacaktır.

Kasım sonunda meydana gelen soğuma, sonbahar ekili ürünlerde vejetatif süreçlerin yavaşlamasına ve yüksek alanlarda ve Ön-Balkan'da, kar örtüsü oluşan yerlerde ise bu süreçlerin durmasına yol açmıştır.

Aralık başında sıcaklıklarda bir artış öngörülmekle birlikte, Güney Bulgaristan ve Karadeniz kıyısındaki bazı lokasyonlar hariç, ortalama günlük değerlerinin kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonu için gerekli olan biyolojik minimumu aşması beklenmemektedir.

Ay boyunca, ülkenin çoğu bölgesinde sonbahar ekili ürünler göreceli bir dinlenme durumunda kalacaktır. İstisnalar, yine, ilk on günün sonunda ve ikinci on günlük dönemin ilk yarısında güney ve güneydoğu bölgelerindeki ürünlerde gözlemlenecektir. Bu süre zarfında, normallerin üzerinde sıcaklıklar, 10–12°C'nin üzerinde maksimum değerler ve kışlık tahıl ürünlerinde gecikmiş vejetasyon için koşullar öngörülmekte, ancak ürünlerin fenolojik durumunda bir değişiklik olası görünmemektedir.

Bu yıl, buğday ekimlerinin önemli bir kısmı gelişimlerinin ilk aşamasında kışı geçirecektir. Ülkenin büyük bölümünde sonbaharın ilk yarısında yaşanan kuraklık, kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonunu kısıtlamış ve geciktirmiştir. Bu nesnel nedenle, ürünler kışa farklı fenolojik fazlarda girecektir: çıkış, 1–2–3 yaprak ve kardeşlenme başlangıcı. Sadece Tuna Ovası'ndaki belirli lokasyonlarda – Novachene agro-meteoroloji istasyonu ve Ruse bölgesi – bulunan buğday ekimlerinin küçük bir kısmı, ürünlerin kış koşullarına en iyi dayandığı kardeşlenme fazındadır.

Aralık ayında, kar örtüsü olmadan ve daha uzun süreli kalıcılık koşullarında, eksi 9–10°C'ye kadar düşmesi öngörülen minimum sıcaklıklar, çıkmış ancak henüz sertleşmemiş kışlık tahıl ürünleri için risk oluşturacaktır.

Ay boyunca beklenen, normaller civarında ve üzerindeki yağışlar, 50 ve 100 cm toprak katmanındaki nem rezervleri seviyesini artıracaktır. Kasım ayının ikinci yarısında yaygın olarak görülen ve ülkenin birçok bölgesinde 40–50 l/m²'yi aşan yağışların ardından, sonbahar ekili ürünlerdeki nem açığı giderilmiştir.

Kaynak: NIMH