

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.01.2023 Брой: 1/2023



Ocak ayının ikinci on günlük döneminin sonunda, ülkenin birçok bölgesinde 18-19°C'ye, bazı bölgelerde (Vidin, Knezha, Loveç, Veliko Tırnovo, Ruse, Silistra, Filibe, Pazardzhik) ise 20-22°C'ye varan olağandışı yüksek sıcaklıklar, sonbaharda ekilen ürünlerde vejetatif süreçlerin aktifleşmesine yol açmıştır. Normalin üzerindeki Ocak sıcaklıkları, meyve bahçelerindeki bitkilerde durgunluk döneminin bozulmasına neden olmuştur. Ülkenin tarla bölgelerinde, sert çekirdekli meyve türlerinde (badem, kayısı, şeftali, kiraz) kitlesel tomurcuk şişmesi kaydedilmiştir.

Önümüzdeki yedi günlük dönemde, tarımsal meteorolojik koşullar değişime uğrayacak olup, bu değişim dönemin ikinci yarısında belirgin olacaktır. Beklenen sıcaklık düşüşü, meyve bahçelerindeki istenmeyen ve erken gelişmeyi ve kışa dayanıklılıklarının azalmasını sınırlandıracaktır.

Dönem boyunca, tarla bölgelerinin çoğunda tahmin edilen ortalama günlük sıcaklıklar, kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonu için gerekli olan biyolojik minimuma yakın olacaktır. İstisnalar, üçüncü on günlük dönemin başında daha yüksek sıcaklıkların öngörüldüğü ve sonbaharda ekilen ürünlerde vejetatif süreçlerin devamı için koşulların oluşacağı doğu bölgelerinde beklenmektedir.

Ocak ayı sonunda, kışlık tahıl ürünleri, başta Tuna Ovası'nın bazı bölgelerindeki ve aşırı güneybatı bölgelerindeki ekili alanlar olmak üzere, üçüncü yaprak ve kardeşlenme büyüme aşamalarında olacaktır. Dönem boyunca, kışlayan tarım ürünleri için kritik minimum sıcaklıklar tahmin edilmemektedir.

Ocak ayının üçüncü on günlük döneminde beklenen yağışlar, geçmiş dönemdeki rüzgarlı ve mevsime aykırı sıcak hava ile ürünlerin zamansız vejetasyonu sonucunda kışlık tahıl ürünlerinde önemli ölçüde azalan üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerini iyileştirecektir.