

Mart için Agrometeorolojik Tahmin

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



Şubat ayının ikinci yarısında mevsim normallerinin üzerinde seyreden, alçak kesimlerin birçoğunda 21-22°C'yi aşan (Knezha - 24°C, Lovech - 23°C, Pleven - 23°C, Plovdiv - 23°C, Chirpan - 23°C) alışılmadık derecede yüksek maksimum sıcaklıklarla karakterize iklim anomalileri, sonbaharda ekilen ürünlerde vejetasyon süreçlerinin başlamasına ve meyve ağaçlarının erken gelişim göstermesine yol açtı.

Mart ayının ilk on günlük döneminde, yalnızca Güney Bulgaristan'ın bazı yerlerinde – Plovdiv, Pazardzhik, Sandanski, Kardzhali ve Haskovo'da, 20-30 l/m2 arasında ekonomik açıdan önemli yağış kaydedildi ve bu durum, sonbaharda ekilen ürünlerde toprak nem rezervlerinin iyileşmesini sağladı.

Orta ve doğu bölgelerde sıcaklıklar, iklim normallarının ve kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonu için gerekli olan biyolojik minimumun üzerindeydi.

Ülkenin alçak kesimlerinde, ikinci on günlük dönemin çoğu gününde, dönem için alışlagelene yakın sıcaklıkların yanı sıra kışlık tahıl ürünlerinde vejetasyonun gecikmesine yol açacak koşulların oluşması öngörülüyor.

Üçüncü on günlük dönemin ilk yarısında sıcaklıklarda artış ve sonbaharda ekilen ürünlerle çok yıllık plantasyonlarda vejetasyon süreçlerinin hızlanması bekleniyor. Mart ayı sonunda buğday ve arpada kardeşlenme aşaması baskın olacak.

Ay boyunca meyve ürünleri çeşitli aşamalardan geçecek - meyve tomurcuklarının şişmesi ve patlamasından, erken çiçek açan sert çekirdekli meyve türlerinde (badem, kayısı, şeftali) yeşil tomurcuk, çiçeklenme ve meyve tutumuna kadar.

Mart ayında eksi 5-10°C aralığında minimum sıcaklıklar öngörülüyor - meyve ağaçlarının çiçekleri ve genç meyve tutumları için kritik değerler.

Ay boyunca beklenen, normaller civarında ve üzerindeki yağışlar, 100 cm'lik toprak katmanındaki nem rezervlerini artıracak. Şubat ayında normallerin altında yağış görülmesi sonucunda, en güney ve güneydoğu bölgelerdeki kışlık tahıl ürünlerinde 50 ve 100 cm'lik toprak katmanındaki nem rezervleri seviyesi mevsime göre alışılmadık derecede düşüktü - bazı yerlerde tarla kapasitesinin %55'inin altındaydı (Sliven, Chirpan tarımsal meteoroloji istasyonları).

Mart ayında öngörülen, sık yağışlı dinamik hava durumu, mevsimlik tarımsal teknik faaliyetlerin uygulanmasını güçleştirecek. Meyve ağaçlarında çiçeklenme öncesi bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için daha elverişli koşullar, ilk on günlük dönemin ikinci yarısında oluşacak. Ay boyunca, üst toprak katmanlarındaki artan nem içeriği, erken ve orta-erken ilkbahar ürünleri ekimi için ayrılan alanlarda ekim öncesi toprak işlemenin uygulanmasını sınırlandıracak. Bu nedenle, güney bölgelerde ayçiçeği için optimal ekim tarihlerinin kaçırılması ihtimali bulunuyor.

Güney Bulgaristan'da ayçiçeği ekimi için tarımsal teknik dönem (15-20.03) Mart ortasında başlıyor ve üçüncü on günlük dönemin ortasında (25.03–5.04) ise – Tuna Ovası'nda başlayacak.

Ülkenin farklı bölgelerinde bitki koruma faaliyetlerinin yürütülmesi için koşulların nerede ve ne zaman oluşacağını **BURADAN görebilirsiniz**

Kaynak: NIMH