

Mayıs Ayı İçin Agrometeorolojik Tahmin – Tarım Ürünlerinde Bir Dizi Mantar Hastalığının Gelişimi İçin Koşullar

Автор(и): Растителна защита

Дата: 08.05.2023 Брой: 5/2023



Mayıs ayının başında, agrometeorolojik koşullar, Nisan ayında Veliko Tırnovo – 112 l/m², Şumen – 108 l/m², Razgrad – 111 l/m², Silistre – 83 l/m², Dobriç – 87 l/m², Elhovo – 121 l/m², Eski Zağra – 99 l/m², Karnobat – 85 l/m²'de kaydedilen önemli yağışların bir sonucu olarak, normalin altındaki sıcaklıklar ve çok iyi toprak nem rezervleri tarafından belirlenecektir. Bu yağışlar, Orta ve Doğu Bulgaristan'ın bazı bölgelerinde aylık normun iki katını aşmıştır.

Майıs айının ilk on гүнлүк дөнeмiнде тaһмин еdilen yағышлар, 50cm ve 100cm тоprak katmanlarındaki тоprak nem rezervlerinin yүksek seviyesini, tarla kapasitesinin (FC) %85'inin үzerinde tutacaktır. Bu durum, gelişimlerinin üreme aşamasına girmiş ve bu aşamada toprak nemi için artan gereksinimlere sahip olan kışlık tahıl ürünleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Bu dönemde, Tuna Ovası'ndaki belirli lokasyonlarda buğday ve arpa ekimlerinde sap uzaması, başaklanma başlangıcı ve başaklanma evreleri gerçekleşecektir.

İkinci on гүнлүк дөнeмiн başında, sıcaklıklarda bir artış, termal koşulların normale dönmesi ve sonbaharda ekilen ürünler ile ekilen ilkbahar ürünlerinde vejetatif süreçlerin hızlanması öngörülmektedir.

Майıs айının ikinci yarısında tarımsal ürünlerin gelişimi, iklim normlarına yakın sıcaklıklarda ilerleyecektir. Bu dönemde, kışlık tahıl ürünlerinde çiçeklenme, döllenme, tane oluşumu ve tane dolumu, ısı ve nemin olumlu bir kombinasyonu altında gerçekleşecektir. Üçüncü on гүнлүк дөнeмiн sonunda, güneydoğu bölgelerindeki ve Tuna Ovası'ndaki bazı buğday ve arpa ekimlerinde, süt olumu aşamasının başlangıcı gözlemlenecektir.

Ay boyunca, mısır ve ayçiçeğinde yaprak oluşumu gerçekleşecektir.

Майıs sonunda, agroteknik dönem içinde ekilen ayçiçeğinde, çiçeklenme tomurcuğunun oluşumu gözlemlenecektir.

Майıs ayındaki sık yağışlar, bir dizi fungal hastalığın gelişimi için koşullar yaratacaktır: buğdayda pas hastalıkları (kahverengi pas, sarı pas), septoria yaprak lekesi ve fusarium; sebze ürünlerinde ve asmalarda mildiyö; meyve ağaçlarında yaprak delen ve kabuklu bit; çileklerde gri küf, erkenci kiraz çeşitlerinin olgunlaşan meyvelerinde kahverengi çürüklük.

Ay boyunca, bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için daha uygun koşullar, ilk on гүнлүк дөнeмiн ikinci yarısında, ikinci on гүнлүк дөнeмiн ortasında ve sonunda ve ayın son günlerinde ortaya çıkacaktır.

Майıs ayında dolu fırtınaları yaygın bir olgudur. Dolu hasarı durumunda, etkilenen meyve ve sebze ürünlerinin ilk fırsatta, patojenler tarafından sekonder enfeksiyon riskini azaltmak ve yaraların daha hızlı iyileşmesini teşvik etmek için bakır içeren fungisitlerle muamele edilmesi tavsiye edilir.