

Batı Polonya tıklayıcı böceği - *Agriotes ustulatus* Schall

Автор(и): Растителна защита
Дата: 05.04.2015 Брой: 4/2015



Batı Polonya telkurdu ülke genelinde bulunur. Mısır, domates, patates, lahana ve diğer bitkilere saldırır.

Ergin böceğin vücudu uzun-oval, açık kahverengiden koyu kahverengine kadar değişir ve 8.5-12 mm uzunluğundadır. Dört takvim yılı içinde gerçekleşen, üç yıllık bir gelişim döngüsüne sahiptir.

Sebze bitkilerindeki en yaygın telkurt türleri, 4-5 yıl boyunca bir nesil geliştirir ve toprakta çeşitli yaşlardaki larvalar ve ergin böcekler olarak kışı geçirir. Kışlamış böcekler, kışlaklarından Nisan sonu ve Mayıs başında çıkarlar. Cinsel olgunluğa ulaşmak için çeşitli bitki türlerinin çiçek kısımları ve yapraklarıyla beslenirler, ardından çiftleşirler ve dişiler yumurtalarını bitkilerin etrafındaki toprağa, tek tek veya gruplar halinde 5-6 cm derinliğe kadar bırakırlar. Nemli ve humusça zengin

toprakları tercih ederler. Bu tür yerler tipik olarak nadas arazileri, yonca tarlaları, çayırlar, açıklıklar vb.'dir. Bir böcek 500-600'e kadar yumurta bırakabilir. Yumurtalar yüksek sıcaklıklara ve düşük neme karşı çok hassastır. Embriyo yavaş gelişir (20-30 gün).