

Haziran ayında tarımsal ürünlerde dolu fırtınaları ve mantar patojenlerinden kaynaklanan yüksek enfeksiyon baskısı olasılığının artması

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.06.2023 Брой: 6/2023



Haziran ayının ilk on günlük döneminde, tarımsal meteorolojik koşullar mevsime göre dengesiz ve serin hava ile belirlenecektir. On günlük dönemde öngörülen yağışlar, 50 cm ve 100 cm toprak katmanlarındaki toprak nem rezervlerinin yüksek seviyede kalmasını sağlayacak – tarla alanlarının çoğunda tarla kapasitesinin (FC) %80-85'inin üzerinde. Haziran başında çok iyi toprak nem rezervlerinin varlığı, kışlık tahıl ürünleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır; bu ürünlerde ülkenin güney ve güneydoğu bölgelerinde tanenin dolması, tanenin oluşumu ve süt olumu aşaması ilerleyecektir. Tane dolumu – süt olumu aşamaları arasındaki dönemde, buğdaya süne

larvaları zarar vermekte olup, bu da ekili alanların tarla kontrollerini ve zararlı yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğini (2 larva/m²) aşması durumunda zamanında ilaçlamayı gerektirir.

İkinci on günlük dönemin başındaki serin havanın ardından, sıcaklıklarda bir artış ve tarım ürünlerinin gelişim hızlarında bir hızlanma öngörülmektedir. Haziran ortasına kadar, tarla alanlarının çoğunda arpa balmumu olumu aşamasına ulaşacaktır.

Haziran ayının ikinci yarısının çoğu gününde, tarım ürünlerinin gelişimi iklim normlarına yakın sıcaklıklarda gerçekleşecektir. Üçüncü on günlük dönemin başında, buğday ağırlıklı olarak olgunlaşma aşamasında olacaktır.

Ayın sonuna doğru, ilkbahar ürünlerinin bir kısmı generatif gelişim aşamalarına girecektir: ayçiçeğinde çiçeklenme başlangıcı gözlemlenecek ve erkenci mısır hibritlerinde ise koçan püskülü çıkışı ve püskül çiçeklenmesi görülecektir.

Haziran ayındaki meteorolojik koşullar, fungal patojenlerin yüksek enfeksiyon zeminini koruyacaktır: sebze ürünlerinde mildiyö, geççi kiraz çeşitlerinde geç kahverengi çürüklük, meyve ağaçlarında ise kabarcık ve külleme. Asmada, salkım çiçeklenmesinden bezelye büyüklüğünde meyve tutumuna kadar olan aşamalar arası dönem, mildiyö enfeksiyonu için kritik öneme sahiptir.

Ay boyunca, bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için daha uygun koşullar, ikinci on günlük dönemin ilk yarısında ve üçüncü on günlük dönemin çoğu gününde oluşacaktır.

Haziran ayında dolu fırtınaları olasılığı yüksek kalacaktır. Bir dolu fırtınasının ardından, etkilenen meyve ve sebze ürünleri ilk fırsatta (tercihen olaydan sonraki 48 saat içinde) bakır içeren fungisitlerle ilaçlanmalıdır.

Kaynak: NIMH