

Теммуз Айында Мейве Баһçесинде

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



Теммуз айында, **elma bahçelerinde** кара леке enfeksiyonu görülmemişse, bu hastalığa karşı ilaçlama durdurulur. Yaprak ve meyvelerde enfeksiyon varlığında ve sık sağanak yağışlarla birlikte, geç enfeksiyon riski ve meyve hasarı derecesindeki artış devam eder; bu durumda bu dönemde bile ilaçlamaları gerekli kılar.

Küllemeye hassas elma çeşitleri için, bu hastalığa karşı ilaçlama da devam eder. Her iki hastalığın eşzamanlı kontrolü için aşağıdaki fungusitlerden biri kullanılır: Küllemeye karşı Bellis – 80 g/da, Sulgran – 750 g/da ve Kumulus – 600–900 g/da; kara lekeye karşı ise Chorus 50 WG – %0.03, Difcor 250 EC – 15 ml/da, Koprations Duo – 300 g/da, Scab – 300 ml/da ve Captan 80 WG – 150–180 g/da. Her iki hastalığın eşzamanlı kontrolü için şunlar uygundur: Flint Max 75 WG – %0.02, Score 250 EC – %0.02, Luna Experience – 20–75 ml/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Revyona – 200 ml/da.

Kara lekeye neden olan mantarın (*Venturia inaequalis*) direnç geliştirmesini önlemek için, patojen üzerinde farklı etki modlarına sahip ürünlerin dönüşümlü kullanılması veya kontrol için fungisit karışımlarının kullanılması en iyisidir.

Kara lekeye dayanıklı çeşitler – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola vb., sadece küllemeye karşı ilaçlanır.

Armut için, kara leke ile beyaz ve kahverengi yaprak lekesine karşı ilaçlamaya devam edilmelidir. Bu hastalıkların kontrolü için aşağıdaki fungisitlerden biri kullanılır: Difcor 250 EC – 15 ml/da, Luna Experience – 20–75 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da.

Erik için Temmuz ayında ilaçlama, kahverengi çürüklük ve pasa karşı yönlendirilir. Kahverengi çürüklüğe karşı, aşağıdaki fungisitlerden biri ile ilaçlama yapılır: Difcor 250 EC – 20 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Chorus 50 WG – %0.045, Geoxe – 40–60 g/da. Pasa karşı ise, kahverengi çürüklüğe karşı da etkili olan Signum WG – 45 g/da onaylıdır.

Temmuz başında, erkenci şeftali çeşitlerinin meyveleri olgunlaşmaya başlar ve bu dönemde ilaçlama yapılmaz.

Geççi şeftali çeşitleri için, külleme, yaprak delen ve kahverengi çürüklük kontrolü devam eder. Küllemeye karşı aşağıdaki fungisitlerden biri kullanılır: Score 250 EC – %0.02, Luna Experience – 50 ml/da, Topaz 100 EC – %0.03, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da. Kahverengi çürüklük kontrolü için, Delan 700 WDG – %0.05, Chorus 50 WG – %0.045 veya Luna Experience – 63–75 ml/da ile ilaçlama yapılır.



Temmuz ayında kayısılar olgunlaşır ve ilaçlanmaz.

Ahududu için, bu dönemde **Lülin gibi yediveren çeşitler** hariç, ilaçlama yapılmaz. Onlar için didymella ve antraknoza karşı mücadele gereklidir. Aşağıdaki fungusitlerden biri kullanılır: Signum WG – 100 g/da ve Funguran OH 50 WP – %0.15. Sık sağanak yağışlar ve yüksek hava nemi ile birlikte, gri küfe karşı ilaçlama da gereklidir. Switch 62.5 – 100 g/da kullanılır.

Hasattan sonra, **çilek plantasyonlarının** yaprakları biçilir, plantasyondan uzaklaştırılır ve yakılarak veya gömülerek çürümeye bırakılmak suretiyle imha edilir.