

Eylül Ayında Bahçedeki Zararlılar

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.09.2023 Брой: 9/2023



Eylül ayında ortalama günlük sıcaklıklar düşer ve ayın ikinci yarısında erken donlar, gök gürültülü fırtınalar ve dolu fırtınaları meydana gelebilir; bunlar bitkilere ve meyve üretimine ciddi zarar verir. Dönem, yazdan sonbahar-kış koşullarına kademeli bir geçiş ile karakterizedir. Ağaçların yaprak aygıtı, meyve beslenmesi, meyve tomurcuklarının farklılaşması ve yedek besin maddelerinin birikimi için asimilat sağlayarak çok aktif bir şekilde fotosentez yapar. Besin maddelerinin daha iyi birikimini, düşük kış sıcaklıklarının daha kolay tolere edilmesini ve takip eden yılda normal meyve vermeyi sağlamak için meyvelerin zamanında hasat edilmesi gerekmektedir.

Meyve bitkilerindeki hastalık gelişimi bu dönemde yatıştır, ancak yağışlı koşullarda elma karalekesi enfeksiyonları, sonbahar ve kış çeşitlerinin hasadı sırasında bile meydana gelebilir. Zararlı yoğunluğu,

birçoğunun hareketsiz evrelere – pupa ve yumurtalara – girmesi nedeniyle önemli ölçüde azalır, ancak elma içkurdu son nesillerinden en son çıkan tırtıllar meyvelerde kurtlanmaya neden olmaya devam eder.



Avrupa kırmızı örümceği

Eylül ayında türün zararlı faaliyeti devam eder. Larvalar, nimfler ve erginler yapraklardan özsu emer, bunun sonucunda klorofil içeriği azalır ve bu da fotosentezi olumsuz etkiler. Şiddetli enfestasyon durumunda yapraklar erken kurur ve dökülür.

Mücadele: Kışlayan akar yumurta stoğunu azaltmak için, ekonomik zarar eşiği olan yaprak başına 3–4 hareketli form olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Ruhsatlı bitki koruma ürünleri: a.i. heksitiazoks 31.2 g/l + fenpiroksimat 62.4 g/l – Nissorun Plus 120 ml/da; a.i. asekuinocyl 164 g/l – Kanemite SC 120–180 ml/da; a.i. Beauveria bassiana, suş ATCC 74040 0.185 g/l – Naturalis – 100–150 ml/da; a.i. parafin yağı 800 g/l – Ovipron Top EC – 1000–2000 ml/da; a.i. tebufenpirad 200 g/kg – Shirudo – 25 g/da.



Armut Psillidi

Eylül ayında dördüncü neslin gelişimi tamamlanır ve beşinci neslin gelişimi başlar. Erginler ve larvalar özsu emer ve bol miktarda tatlımsı madde salgılar, bu da isli mantar oluşumuna yol açar. Şiddetli enfestasyon durumunda tüm ağaçlar ölebilir.

Mücadele: Kitle halinde kışlama alanlarına hareketten önce ve kışlayan armut psillidi popülasyonunu azaltmak için, ekonomik zarar eşiği olan ağaç başına ergin ve larvalardan oluşan koloniler bulunan %4–6 sürgün olduğunda ilaçlama yapılmalıdır.

Ruhsatlı bitki koruma ürünleri: a.i. tebufenpirad – Shirudo 25 g/da; a.i. spirotetramat – Movento 100 SC 0.12–0.15%; a.i. Beauveria bassiana, suş ATCC 74040 0.185 g/l – Naturalis – 100–150 ml/da; a.i. deltametrin 100 g/l – Decis 100 EC – 100–150 ml/da.



Armut Tomurcuk Hortumlu Böceği

Armutun ciddi bir zararlısıdır, yılda bir nesil verir ve yumurta halinde tomurcuklarda kışlar. Larvalar ilkbaharda çıkar, erginler Mayıs'ta görülür ve Eylül sonuna kadar diyapoza girer. Daha sonra tekrar ortaya çıktıklarında, yumurtalarını kışı geçirecekleri tomurcuklara bırakırlar.

Mücadele: Mücadele önlemleri, sonbaharda ilk çiftleşen çiftler tespit edildiğinde, yumurta bırakmadan önce erginlere yöneliktir.

Ruhsatlı bitki koruma ürünleri: Resmi olarak kayıtlı ürün bulunmamaktadır; diğer zararlılara karşı uygulanan konsantrasyonlarda tüm temas etkili insektisitler kullanılabilir.

** Makale 15.09.2025 tarihinde güncellenmiştir.*