

Ekim – kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için optimal koşullar ve sebze ürünleri ile geç çeşit meyve ağaçları ve üzümlerden ek üretim

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.10.2023 Брой: 10/2023



Ekim ayında tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normalleri civarında ve üzerindeki sıcaklıklar ile aylık normalleri civarında ve altındaki yağışlar tarafından belirlenecek.

Ekim ayının başında, maksimum değerleri 30-32°C'ye kadar çıkacak olan normalin üzerindeki sıcaklık tahmini, geç çeşit meyve ağaçları ve üzümelerde olgunlaşma süreçlerini hızlandıracak ve geç tarla üretimi sebze bitkilerinden (domates, biber, kabak, kornişon) ek ürün hasadı için koşullar yaratacaktır. Normalin üzerindeki

termal koşulların bir sonucu olarak, geç kırmızı şaraplık üzüm çeşitleri teknolojik olgunluğa her zamanki tarihlerden daha erken ulaşacak ve sonbahar meyve çeşitleri ise hasat olgunluğuna gelecektir.

İlk on günlük dönemin ikinci yarısındaki nispeten kuru ve mevsime göre sıcak havanın ardından, tarımsal meteorolojik koşullar bir değişim geçirecek. Bu dönemde, minimum sıcaklıklarda önemli bir düşüş, çanaklar ve yüksek tarlalarda don oluşumu için koşullar tahmin edilmekte olup, bu durum dona hassas sebze bitkilerinin (domates, biber) zamanında hasat edilmesini gerektirecektir.

İlk on günlük dönemin sonu ve ikinci on günlük dönemin başında, ekonomik öneme sahip yağışlar, üst toprak katmanlarındaki toprak nem rezervlerinde ve mevsimlik toprak işleme çalışmalarının yürütülmesi koşullarında bir iyileşme beklenmektedir. Güneydoğu bölgeleri hariç, ülkenin birçok yerinde yaz sonu ve sonbahar başındaki kuraklık, sonbahar ürünleri ekimi için ayrılan alanlarda ekim öncesi toprak işlemeyi geciktirdi. Bu nedenle, tarla bölgelerinin büyük bir kısmında, kışlık kanolanın ekimi için Eylül ayındaki tarımsal teknik son tarihler kaçırıldı.



Ekim ayı, kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için optimal dönemdir. İlk on günlük dönem, Kuzey Bulgaristan'da buğday ekimi için tarımsal teknik son tarihtir; Güney Bulgaristan'da 15-25 Ekim tarihleri arasında ve ayın sonunda ise Karadeniz kıyısı boyunca ekim yapılır.

Ekim ayının ikinci yarısındaki günlerin çoğunda, ekilen sonbahar ürünlerinin ilk vejetasyon aşamaları normalin üzerindeki termal koşullar altında ilerleyecek. Üçüncü on günlük dönemin ortasında ve sonunda, yağış olasılığı,

50 cm toprak katmanındaki toprak nem rezervlerinde ve kışlık tahıl ürünlerinin gelişimi için koşullarda bir iyileşme tahmini bulunmaktadır. Ekim sonunda, buğdayda ekim tarihlerine bağlı olarak şu aşamalar gözlemlenecektir: çıkış ve yaprak oluşumu (1-3 yaprak).

Ekim ayındaki tahmini termal koşulların norm civarında ve üzerinde olması, sonbahar ürünlerindeki tehlikeli zararlılardan biri olan tarla faresinin popülasyonunda bir artış için ön koşuldur. Ay sonunda, sonbahar ürünleri zararlıının varlığı açısından incelenmeli ve yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğini (dekar başına 2 aktif koloni) aştığı yerlerde, zamanında bitki koruma önlemleri (koloni girişlerine yerleştirilen zehirli yemler) gereklidir.

Elma ve armut bahçelerinde, yaprak dökümünün başlangıcında, meyve hasadından sonra, ağaçların %5'lik üre çözültisi ile püskürtülmesi tavsiye edilir. Bu uygulama, kabuklu leke enfeksiyonunu sınırlar.

Sert çekirdekli meyve türlerinde, bakteriyel kansere, şeftali yaprak kıvrıcıklığına, yaprak delen hastalığına ve kayısı, kiraz ve vişnede erken kahverengi çürüklüğe karşı, kitlesel yaprak dökümünden sonra, %2'lik Bordo bulamacı ile püskürtme yapılmalıdır.

Kaynak: NIMH