

Kasım ayının sonunda, istikrarsız ve nemli hava, kalıcı ekimlerde mevsimlik toprak işleme ve fitosaniter faaliyetlerin yürütülmesini sınırlandıracaktır.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.11.2023 Брой: 11/2023



Geçtiğimiz dönemde, Doğu Bulgaristan'ın birçok bölgesinde ve Batı Bulgaristan'ın bazı yerlerinde 20-50 l/m² arasında yağış kaydedilmiş olup, bu yağışlar Silistra, Dobriç, Şumen, Razgrad, Elhovo, Varna, Burgaz, Ahtopol, Karnobat, Novo selo, Vidin, Lom, Sofya ve Dragoman'da 50 cm toprak katmanındaki nem rezervlerini artırmıştır.

Kasım ayı sonunda, yaygın yağışlar ve daha derin toprak katmanlarındaki nem rezervlerinde bir artış beklenmektedir. Ortalama günlük sıcaklık değerlerinin, kışlık tahıl ürünleri ve kışlık kanolanın gelişimi için gerekli

olan biyolojik minimumun çevresinde ve altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Batı Bulgaristan ve Tuna Ovası'nda yağışlar kar şeklinde olacak ve bir kar örtüsü oluşacak; bu da en geç ekilen ürünleri, yer yer eksi 7-8°C'ye kadar düşmesi beklenen sıcaklıklardan koruyacaktır. Sadece Karadeniz kıyısı boyunca ve en güney bölgelerde, sonbaharda ekilen ürünlerde gecikmiş vejetasyon oluşması için koşullar yaratılacaktır. Bu dönemde, kışlık tahıl ürünlerinde şu büyüme aşamaları gözlemlenecektir: çıkış ve yaprak oluşumu (1-2-3 yaprak). Tuna Ovası'ndaki bazı yerlerde – Silistra ve Novachene tarımsal meteoroloji istasyonları – daha erken ekilen buğday ürünleri kasım ayı ortasında üçüncü yaprak aşamasına girmiştir.

Dönem boyunca hakim olan istikrarsız ve nemli hava, çok yıllık ürünlerde mevsimlik toprak işleme ve fitosaniter faaliyetlerin yürütülme imkanlarını kısıtlayacaktır.

Kaynak: NIMH