

Aralık – sonbahar ürünlerinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklardan göreceli durgunluğun yeniden sağlanmasına

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.12.2023 Брой: 12/2023



Kasım ayı sonunda sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüşün, tarla alanlarının büyük bölümünde sonbahar ekili ürünlerde vejetasyonu yavaşlatması ve durdurmasının ardından, aralık ayı başında agrometeorolojik koşullarda önemli bir değişim yaşanacak.

Ayın ilk günlerinde sıcaklıklarda bir artış öngörülmekte olup, güney bölgelerde ve Karadeniz kıyı şeridinde günlük ortalama değerler, kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonu için gerekli biyolojik minimumun üzerine çıkacak.

Aralık ayı başında Doğu Bulgaristan'daki agrometeorolojik koşullar, ülkenin geri kalanından önemli ölçüde farklılık gösterecek. Doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar öngörülmekte olup, maksimum değerler yaklaşık 17°C-18°C civarında ve günlük ortalama değerler, kışlık tahıl ürünlerinin vejetasyonu için gerekli biyolojik minimumun önemli ölçüde üzerinde seyredecek.

Ayın ilk on günlük periyodunun ikinci yarısında sıcaklıklarda bir düşüş ve sonbahar ekili ürünlerde göreceli dormansi (dinlenme) halinin yeniden başlaması bekleniyor.

İkinci ve üçüncü on günlük periyotların çoğu gününde agrometeorolojik koşullar dinamik olacak, günlük ortalama sıcaklıklarda iklim normalleri civarında ve üzerinde seyreden kısa dönemler birbirini takip edecek, ancak bu aralıklar, ülkenin tarla alanlarının büyük bölümünde kışlık tahıl ürünlerini dormansi halinde tutacak. En güneydeki bölgelerde yine istisnalar beklenmekte olup, nispeten daha sıcak geçen dönemlerde sonbahar ekimli ürünlerde kısa süreli, gecikmiş bir vejetasyon için koşullar oluşacak, ancak bu, bitki örtüsünün fenolojik durumunda önemli bir değişikliğe yol açmayacak.



Bu yıl uzayan sonbahar kuraklığı buğday ekimini geciktirdi ve bitki örtüsünün büyük bir kısmı, agroteknik takvimdeki son tarihlerden sonra, kasım ayında ekildi. Bu nedenle kasım ayında ekilenler, kışa çıkış ve 1-2 yaprak aşamasında girecek. Ekim ayında ekilen kışlık tahıl ürünlerinde ise kış başında üç yapraklı aşamadaki bitkiler hakim olacak.

Aralık ayında öngörülen, eksi 9-10°C'ye varan minimum sıcaklık değerleri, kar örtüsüz koşullarda ve daha uzun süreli olması halinde, henüz sertleşmemiş, geç ekilmiş kasım ayı bitki örtüsü için risk oluşturacak.

Ay boyunca öngörülen yağışlar iklim normallerine yakın olacak ve topraktaki nem rezervi seviyelerini, daha derin toprak katmanlarında bile artıracak. Kasım ayının üçüncü on günlük periyodunda yaygın olarak görülen yağmur ve kar yağışlarının (ülkenin birçok bölgesinde 50-60 l/m²'yi, Tuna Ovası'nın bir kısmında ise 80-90 l/m²'yi aşmıştır) ardından, 100 cm'lik toprak katmanında nem rezervlerinde bir artış meydana geldi ve sonbahar ekili ürünlerdeki nem açığı giderildi.

Dönem boyunca beklenen yağışlar, üst toprak katmanlarındaki yüksek nem içeriğini koruyacak ve meyve bahçelerinde mevsimlik toprak işleme ve fitosaniter faaliyetlerin yürütülmesi için elverişsiz koşullar oluşturacak.

Kaynak: NIMH (Ulusal Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü)