

Осак айы олағандығы үйксек сываклықларла бағлыор

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.01.2024 Брой: 1/2024



Kış başlangıcındaki, birçok yerde 20–21°C'yi aşan alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklarla karakterize iklim anomalileri, ülkenin ekilebilir bölgelerinin bazı kısımlarında sonbaharda ekilen ürünlerde vejetasyon süreçlerinin yeniden başlamasına yol açtı. Mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcak hava, bazı aşırı güneybatı bölgelerinde, kıvılcık, kayısı, şeftali ve kiraz gibi erken çiçek açan bazı çalı ve meyve türlerinde erken ve istenmeyen tomurcuk şişmesine neden oldu.

Ocak айы başında, tarımsal meteorolojik koşulların, ekilebilir bölgelerdeki ortalama günlük değerlerin kışlık tahıl ürünlerinde gecikmiş vejetasyonun oluşması için gerekli biyolojik minimumun üzerinde seyrettiği, normalin üzerindeki sıcaklıklarla belirlenmeye devam etmesi bekleniyor.

İlk on günlük dönemin ikinci yarısında sıcaklıklarda bir düşüş ve tarımsal meteorolojik koşullarda bir değişiklik öngörülüyor. Bu dönemde beklenen soğuma, kışlık tahıl ürünlerindeki geç vejetasyonu sonlandıracak ve aksi takdirde kış dayanıklılıklarının azalmasına yol açacak olan bazı ağaç türlerindeki zamansız gelişimi engelleyecektir. İkinci ve üçüncü on günlük dönemlerde ise tarımsal meteorolojik koşullar, kışlık tahılları dormansi (dinlenme) halinde tutacak olan iklim normallarına yakın sıcaklıklarla belirlenecek.

Ocak ayında, buğday ve arpa tarlaları farklı fenolojik aşamalarda kışlayacak. Sonbahar sonunda ekilen geç ekimli kışlık tahıllar, Băzovec, Nikolaevo, Kazanlăk, Sliven ve Chirpan tarımsal meteoroloji istasyonlarında çıkış ve ilk yaprak oluşumu aşamasında bulunuyor. Kneža, Tărgoviște, Pazardžik, Haskovo ve Ljubimec'te Kasım ayında ekilen tarlalarda ise üçüncü yaprak aşaması hakim durumda. Tuna Ovası'ndaki bazı yerlerde – Novachene tarımsal meteoroloji istasyonu – ve Yukarı Trakya Ovası'nda Plovdiv bölgesindeki buğday ve arpa tarlalarının küçük bir kısmı, kışlamak için uygun aşama olan kardeşlenme (tillering) aşamasında. Ocak ayında öngörülen, eksi 13°C'ye varan minimum sıcaklıkların, kalıcı ürünlere ve kardeşlenme aşamasına girmiş kışlık tahıllara risk oluşturması beklenmiyor. Kar örtüsüz koşullarda, eksi 10–13°C aralığındaki değerler, daha uzun bir süre devam etmeleri halinde, geç ekilmiş ve iyi gelişmemiş tarlalar için kritik olacaktır. Ocak ayında normun civarında ve üzerinde öngörülen yağışların, bir metre ve iki metrelik toprak katmanlarındaki toprak nem rezervlerini artırması bekleniyor. Aralık ayı sonunda, ekilebilir bölgelerin çoğunda buğday için bir metrelik katmandaki toprak nem rezervleri, tarla kapasitesinin (FC) %85-90'ının üzerindeydi.

Ay boyunca, yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kış budaması yapmak için daha uygun koşullar, ilk on günlük dönemin başında ve üçüncü on günlük dönemin çoğu gününde oluşacak.

Kaynak: NIMH (Ulusal Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü)