

İkinci on günlük dönemin sonu ve üçüncü on günlük dönemin başında yaşanan soğuk hava dalgası, kışlayan tarım ürünlerindeki dormansi durumunu koruyacaktır.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 19.01.2024 Брой: 1/2024



Ayın ortasında ülkenin birçok bölgesinde 14-15°C'yi aşan kayıtlara geçen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların ardından, Ocak ayının üçüncü on günlük döneminde tarımsal meteorolojik koşullar önemli bir değişikliğe uğrayacak. Ocak ayının ikinci on günlük döneminin sonu ve üçüncü on günlük döneminin başında öngörülen soğuma, kışlayan tarım ürünlerinde dormansi (dinlenme) halini koruyacak. Beklenen kar yağışı, tarla alanlarının çoğu üzerinde bir kar örtüsü oluşturacak ve bu da sonbaharda ekilen ürünleri öngörülen düşük minimum sıcaklıklardan – yer yer eksi 12°C'ye kadar – koruyacak. Bu değerler, kar örtüsünün olmaması

durumunda, çıkış ve ilk yaprak oluşumu aşamalarında olan geç ekilen kışlık tahıl ürünleri için kritik olacaktır. Sonbahar kuraklığı ve geç ekim nedeniyle, hakim ürünler üç yaprak aşamasında kışlamaktadır. Tuna Ovası'nda (Novachene, Silistra tarımsal meteoroloji istasyonları) ve Yukarı Trakya Ovası'nda (Pazardzhik, Plovdiv tarımsal meteoroloji istasyonları) yer yer buğday ve arpa ekimlerinin küçük bir kısmı kardeşlenme aşamasındadır – kışlamak için uygun aşama.

Cumartesi günü, soğuma, yaygın yağışla, ağırlıklı olarak kar ve öğleden önce Güneydoğu Bulgaristan ile en güneybatı bölgelerde yağmur olarak başlayacak. Çoğu bölgede 5 ila 10 cm arasında bir kar örtüsü oluşacak; Ön Balkan ve Rila-Rodop bölgesinde, önemli yağış koşullarının olduğu yerlerde kar örtüsünün kalınlığı 25-30 cm'ye ulaşacak. Tuna Ovası, Dobruca ve Ludogorie'de, ayrıca dağ geçitlerinde kar fırtınası olacak ve kar yığınları oluşacak.

Belirgin sıcaklık düşüşüyle birlikte, Dobriç Online, ürünlerin soğuktan tehdit altında olup olmadığı konusunda Dobruca Tarım Enstitüsü – General Toshevo'dan Prof. Dr. Ivan Kiryakov'ın uzman görüşüne yer veriyor. Kiryakov'a göre, Bulgaristan'da yaygın olan çeşitler, kuru soğuk koşullarında bile -10 dereceyi oldukça güvenle tolere edebilir. Ciddi bir tehlike yok, ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle ürünler neredeyse hiç sertleşmemiş durumda. Öte yandan, yüksek sıcaklıklar buğdayın gelişmesine ve kardeşlenmesine olanak sağladı.

Ivan Kiryakov, genellikle kuru soğuğun ürünleri tehdit ettiğini açıklıyor. Ancak Dobruca'daki ve sadece oradaki değil, arazideki gözlemleri, hafif bir kar örtüsü altında ürünlerin nemli ve korunduğu yönünde. "Kardeşlenme düşümünün bulunduğu yerdeki sıcaklık yaklaşık -2 derece ve korunuyor".

Ve sıcaklıklar -15 dereceye ulaşsa bile, profesör bitkiler için bir tehdit olmadığını söylüyor. "Daha sonra çeşit haline gelen tüm ıslah hatları, bizde kışa dayanıklılık testlerinden geçer, iklim odalarında -18 dereceye kadar dondurulurlar. Böyle bir sıcaklığa dayanamayan ve çeşit olarak devam eden hatlarımız yok. Eğer böyle hatlar varsa, onları çeşit olarak piyasaya sürmeyiz". Prof. Kiryakov, iklim testi sırasında bitkilerin yaklaşık 10 cm toprak içinde odalarda 24 saat kaldığını, bunun da dayanıklılıklarının göstergesi olduğunu açıklıyor.

Önümüzdeki dönemin sonunda, ortalama günlük sıcaklıklarda bir artış öngörülüyor, ancak bu artış sonbahar ürünlerini dormansi halinde tutacak sınırlar içinde kalacak.

Dönemin ikinci yarısında meyve bahçelerinde budama yapma koşullarında bir iyileşme beklenmektedir. Budamaya soğuğa dayanıklı yumuşak çekirdekli meyve türleri (elma, armut) ve yaşlı meyve veren ağaçlarla başlanmalıdır. Fitosaniter budamanın gerekli olduğu yerlerde, her kesimden sonra aletlerin dezenfekte edilmesi zorunludur.

Kaynak NIMH, www.dorbichonline.com