

# Şubat sonu – ilkbahar ekimleri için ayrılan tarlaların toprak işlemesi, kalıcı bitkilerde budama ve bitki koruma ilaçlaması için uygun koşullar.

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 26.02.2024 Брой: 2/2024



Şubat ayı sonunda, kışlık tahıl ürünlerinde vejetatif süreçlerin yeniden başlaması ve ilerlemesi için gerekli biyolojik minimumun üzerindeki ortalama günlük sıcaklıklar, agrometeorolojik koşulları belirlemeye devam edecek. Nem birikiminin sonbahar-kış dönemi sonunda, ekilebilir arazilerdeki toprak nem rezervleri (bir metre katmanda) tarla kapasitesinin (TK) %70 ila %90'ı arasındadır.

Dönem içinde, geç ekilen ve gelişimde geri kalmış buğday ve arpa ekili alanlarında üçüncü yaprak büyüme aşaması gözlenecektir. Tuna Ovası'ndaki ve ülkenin güney bölgelerindeki bazı izole lokasyonlardaki (Băzovec, Knezha, Novachene, Nikolaevo, Dolni Chiflik, Targoviște, Silistra, Lyubimets, Plovdiv, Pazardzhik, Kyustendil ve Sandanski agrometeoroloji istasyonları) ekili alanlarda kardeşlenme aşaması gözlenecektir. Sert çekirdekli meyve türlerinde tomurcuk şişmesi meydana gelecektir.

---

## Buğday Yer Böceği – *Zabrus tenebrioides*

---

Dönemin çoğu gününde, yağış beklenen batı bölgelerdeki bazı yerler hariç, şu işlemler için koşullar uygun olacaktır: ilkbahar ürünleri ekilecek tarlalarda toprak işleme; kalıcı ürünlerde budama ve bitki koruma ilaçlaması; buğday ve arpa ekili alanlarının tarla faresi ve buğday yer böceği larvalarının varlığı ve zararlı faaliyeti açısından kontrol edilmesi. Kışlık tahıl ürünlerinde vejetasyonun yeniden başlaması göz önüne alındığında, ekili alanların azotla gübrenmesinin tamamlanmasına öncelik verilmelidir.

*Kaynak: NIMH*