

Mart ayının başında normalin üzerindeki sıcaklıklar, tarım ürünlerinde vejetatif süreçlerin aktif ilerlemesini sağlayacak

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.03.2024 Брой: 3/2024



Şubat ayında, normalin üzerindeki ortalama günlük sıcaklıklar ve kaydedilen, bazı yerlerde 23°-24°C'ye (Vidin, Montana, Knezha, Loveç, Veliko Tırnovo, Ruse, Filibe, Pazardzhik, Eski Zağra, Hasköy, Elhovo, Sliven) ulaşan, 20°C civarında ve üzerindeki alışılmadık derecede yüksek maksimum değerler, sonbaharda ekilen ürünlerde vejetasyon süreçlerinin yeniden başlamasına ve sert çekirdekli meyve ağaçları ile bazı yumuşak çekirdekli türlerde – elma, agrometeoroloji istasyonları Nikolaevo ve Novachene – erken gelişim ve tomurcuk şişmesine yol açtı. Ay boyunca normalin altında seyreden yağışlar, Kuzey-Orta ve Doğu Bulgaristan'ın bazı bölgelerinde ve

Yukarı Trakya Ovası'nın izole yerlerinde, bir metrelik toprak katmanında (tarla kapasitesi) tam doygunluğa ulaşılmasına izin vermedi.

Mart ayının ilk on günlük döneminin ilk günlerinde, iklim normallarının üzerinde sıcaklıklar ve tarım ürünlerinde vejetasyon seyri için uygun koşullar öngörülmektedir. Dönem sonuna doğru, sıcaklıklarda, kışlık tahıl ürünlerinde vejetatif süreçlerin seyri için gerekli biyolojik minimuma yakın, iklim normallarına yakın değerlere bir düşüş beklenmektedir.

Dönem boyunca, kışlık tahıl ürünlerinde vejetatif süreçler, ayın ilk on günlük dönemi için iklim normallarına yakın ortalama günlük sıcaklıklarda yavaş bir tempoda ilerleyecektir. Buğday ve arpada kardeşlenme aşaması – başlangıç ve tam kardeşlenme – gerçekleşecektir. Sert çekirdekli türlerde, en ileri ağaçlarda tomurcuk patlaması, yeşil salkım ve çiçeklenme başlangıcı aşamaları görülecektir. Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında tomurcuk şişmesi gözlemlenecektir. Asmada özsu akışı gerçekleşecektir – agrometeoroloji istasyonu Bazovets. Dönem boyunca, erken gelişen sert çekirdekli meyve türleri için kritik minimum sıcaklıklar öngörülmemektedir.

Dönem boyunca sık görülecek yağışlar, mevsimlik agroteknik faaliyetlerin yürütülme olanaklarını kısıtlayacaktır – ayçiçeği ekimi için ayrılan alanlarda ekim öncesi toprak işlemesi yapılması, sonbaharda ekilen ürünlerin azotlu gübrelerle üst gübrelemesinin tamamlanması, meyve bahçeleri ve bağlarda budamanın bitirilmesi ve meyve ağaçlarında çiçeklenme öncesi uygulamaların yapılması.

Mart ayının ikinci ve üçüncü on günlük dönemlerinde, agrometeorolojik koşullar dinamik hava durumu tarafından belirlenecektir. Öngörülen normalin üzerindeki sıcaklıklar, tarım ürünlerinde vejetatif süreçlerin aktif bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Ay boyunca, buğday ve arpada kardeşlenme aşaması gözlemlenecek ve Tuna Ovası'ndaki en ileri ürünlerde, Mart sonuna doğru sap uzaması başlangıcı meydana gelecektir. Meyve ürünlerinde, tomurcuk şişmesi ve tomurcuk patlamasından, erken çiçek açan sert çekirdekli meyve türlerinde – kayısı, şeftali, kiraz – yeşil salkım ve çiçeklenme başlangıcına kadar farklı aşamalar gözlemlenecektir.

Mart ayında, eksi 5°C'ye kadar düşmesi öngörülen minimum sıcaklıklar, devam etme sürelerine bağlı olarak, gelişiminde ilerlemiş olan ve tomurcuk oluşumu ve çiçeklenme aşamalarındaki meyve ürünleri için risk oluşturacaktır.

İlk on günlük dönemin sonunda, ikinci on günlük dönemin ortasında ve ayın sonunda beklenen yağışlar, bir metrelik toprak katmanındaki toprak nem rezervlerini artıracaktır.

Ay boyunca öngörülen kararsız hava durumu, mevsimlik agroteknik faaliyetlerin yürütülme olanaklarını kısıtlayacaktır. Meyve bahçelerinde, çiçek yanıklığına (erken kahverengi çürüklük), yaprak deliği hastalığına, şeftali yaprak kıvrıcıklığına ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında kabuklu lekeye karşı çiçeklenme öncesi bitki koruma ilaçlaması yapmak için daha uygun koşullar, ilk on günlük dönemin ilk yarısında, ikinci on günlük dönemin başında ve sonunda oluşacaktır. Mart ayında, ayçiçeği ekimi için optimal agroteknik dönemler başlar – 15 Mart'tan itibaren Güney Bulgaristan için ve 25 Mart'tan itibaren Kuzey Bulgaristan için.

Kaynak: NIMH