

Mart ayının üçüncü on günlük döneminde – don riski

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2024 Брой: 3/2024



Mart ayının ikinci on günlük döneminin sonu ve üçüncü on günlük döneminin başında, ülkenin tarla alanlarının birçok yerinde don oluşumu için koşullar oluştu ve bu da meyve ağaçlarının çiçeklerinde değişen derecelerde hasara neden oldu.

Önümüzdeki yedi günlük dönemde tarımsal meteorolojik koşullar yine dinamik hava durumu tarafından belirlenecek. Güz ekili ürünlerde vejetasyon süreçlerinin devamı için gerekli olan biyolojik minimumun üzerinde ortalama günlük sıcaklıklar öngörülüyor. Buğday ve arpada kardeşlenme evresi devam edecek. Sadece ülkenin güney bölgelerindeki izole yerlerde sap uzama evresi gözlemlenecek.

Dobruca Tarım Enstitüsü (DAI) - General Toshevo'dan alınan verilere göre, Ekim 2023'ten Şubat sonuna kadar toplam yağış miktarı 205 litre/metrekaaredir. Ancak, 2024'ün ilk iki ayında toplam 22 litre/metrekaare yağış düştü. Aynı zamanda 16°C'nin üzerinde ve yer yer 19.6°C'ye varan yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Bu koşullar altında buğday genellikle dormansiye (dinlenme) girmez.

Son yıllarda, Nisan ayı boyunca artık yaygınlaşan olaylara tanık oluyoruz – düşük sıcaklıklar ve donlarla birlikte ani soğuk hava dalgaları. İlkbahar soğukları, kuraklıkla birleştiğinde buğday üzerinde ciddi bir etkiye sahip olabilir.

Bazı tarlalarda septoria yaprak lekesi varlığı gözlemlenmektedir, ancak fungusitlerle tedavi için henüz çok erken olduğunu DAI'den Prof. Dr. Ivan Kiryakov Agri.bg'ye bildirdi. Mart sonunda, Bölge Tarım Müdürlüğü tarafından oluşturulan bir komisyon, ekili alanların durumunu, gelişim aşamalarını ve tahıl alanlarında ele alınması gereken olası sorunları belirlemek için Dobriç bölgesindeki buğday tarlalarını denetleyecek.

Kalıcı ürünlerde (meyve bahçeleri, bağlar) çeşitli fenolojik evreler gerçekleşecek – tomurcuk şişmesi ve patlamasından çiçek tomurcuğu, çiçeklenme ve yapraklanmaya kadar. Dönemin ilk günlerinde donlar ve negatif minimum sıcaklıklar öngörülmekte olup, bu durum gelişiminde ileri aşamada olan meyve ürünleri için risk oluşturacaktır.

Dönemin ikinci yarısında beklenen yağışlar tarla çalışmaları için fırsatları sınırlandıracak. Mevsimlik tarımsal teknik faaliyetlerin – ekim öncesi toprak işleme ve ayçiçeği ekimi ile tarımsal ürünlerde bitki koruma ilaçlamalarının yürütülmesi için daha uygun koşullar dönemin başında mevcut olacak. İlaçlamalar sakın havalarda ve rüzgar hızı 2-3 m/s'ye kadar olan koşullarda yapılmalıdır. Bu dönemde, Kuzey Bulgaristan'da ayçiçeği ekimi için optimal tarımsal teknik zaman dilimi başlar.

Kaynak: NIMH ve Agri.bg