

Mayıs – deęişken hava ve mantar enfeksiyonu seviyelerinde artış için kořullar

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.05.2024 Брой: 5/2024



Mayıs ayının ilk on günlük döneminin çoęu gününde, agrometeorolojik kořullar sık yağışlı istikrarsız hava durumu tarafından belirlenecek olup, bu durum mantar hastalıklarının enfeksiyon arka planını artıracak kořullar yaratacaktır. Tarım ürünlerinde vejetatif süreçler, iklim normlarına yakın sıcaklıklarda orta hızda ilerleyecektir.

Nisan ayının ikinci yarısında, çoęu tarla alanında 30-50 l/m² arasındaki yağışlar, Kuzeybatı Bulgaristan'daki bazı yerler hariç, sonbahar ürünlerinde toprak nemi açığının giderilmesine katkıda bulunmuştur. Mayıs ortasına kadar tahmin edilen yağışlar, 50 cm'lik toprak tabakasında nispeten iyi nem rezervlerini, Tarla Kapasitesi (FC) %75'in üzerinde tutacaktır. İlk on günlük dönemde buęday ürünleri başaklanma evresine girecek – başlangıç ve kütleli. Kanola çiçeklenme döneminde olacaktır.

İlk on günlük dönemde mevsimlik agroteknik faaliyetlerin ve bitki koruma ilaçlamalarının yapılması için daha uygun koşullar, nispeten kuru hava tahmin edildiğinde dönemin ortasında olacaktır.



Ortak tahıl yaprak böceği buğday verimini ciddi şekilde tehdit ediyor

Bu dönemde kışlık tahıl ürünleri, zararlı tahıl böceği ve ortak tahıl yaprak böceğinin varlığı ve yoğunluğu açısından incelenmelidir.



Asmalarda çiçek salkımlarındaki zarar, üzüm salkım güvesinin birinci nesil larvaları tarafından neden olur. Şaraplık çeşitler için 100 salkımda 6-8 larva ve sofralık çeşitler için 100 salkımda 4-6 larva olan ekonomik zarar eşiğine (EZE) ulaşıldığında, zamanında ilaçlama zorunludur.

Ay ortasına kadar süren istikrarsız havanın ardından, Mayıs ayının ikinci yarısında agrometeorolojik koşullarda bir değişiklik bekleniyor. Ortalama günlük sıcaklıklarda artış ve sonbahar ve ekilen ilkbahar ürünlerinde vejetatif süreçlerde hızlanma tahmin ediliyor. Bu dönemde ayçiçeği ve mısırdaki yaprak oluşumu gerçekleşecektir.

Mayıs sonunda beklenen yağışlar, kışlık tahılların toprakta artan nem gereksinimlerini sağlayacaktır. Bu dönemde buğday süt olum döneminde olacaktır. Agroteknik sürede ekilen ayçiçeği ürünlerinde çiçeklenme oluşumu gözlemlenecektir. Mayıs ayında dolu fırtınası olasılığı ve tarım ürünlerinde hasar riski devam etmektedir. Doludan etkilenen çok yıllık ürünler ve sebze ürünleri için, patojenlerle ikincil enfeksiyon riskini sınırlamak amacıyla bakır içeren fungisitlerle ilaçlama önerilir.

Çeşitli hastalıklara karşı bitki koruma ilaçlamaları yapmak için daha uygun koşullar – erken kahverengi çürüklük, delik hastalığı, yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kara leke, sebze ürünleri ve asmalarda mildiyö, buğdayda fusarium baş yanıklığı – Mayıs ayının ilk on günlük döneminin sonunda, ikincinin başında ve sonunda ve üçüncü on günlük döneminin çoğu gününde mevcut olacaktır.

Kaynak NIMH