

Ağustos Ayında Bahçede Yapılacak Tarımsal Faaliyetler

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 05.08.2024 *Брой:* 8/2024



Ağustos ayında sürgün büyümesi tamamlanmıştır. Sonbahar elma, armut ve şeftali çeşitlerinin meyveleri yoğun bir şekilde büyümekte ve aynı zamanda meyve tomurcuklarının farklılaşma süreci gerçekleşmektedir. Ağaçlar yedek besin maddeleriyle beslenmektedir.


Ay boyunca agrometeorolojik koşullar, iklim normalleri civarında ve üzerindeki sıcaklıklarla belirlenecektir. Ay boyunca ürün gelişimi için sınırlayıcı bir faktör, toprak nemi açığı olmaya devam etmektedir. Temmuz sonundaki yağışlar düzensiz dağılmış ve ülkenin çoğu bölgesinde, nem açığını gidermek için geç ve son derece yetersiz kalmıştır. Batı ve güney bölgelerin bazılarında, 50 ve 100 cm katmanlardaki toprak nem rezervleri tamamen tükenmiştir. Temmuz sonunda 30-40 l/m²'nin üzerinde yağış kaydedilen (Razgrad, Şumen, Ruse, Burgas,

Çırpan) Doğu Bulgaristan'daki bazı yerlerde istisnalar bulunmakta olup, bu yağışlar üst toprak katmanlarını nemlendirmiştir.

Ağustos ayının çoğu gününde, tahmin edilen nispeten kuru hava, geççi meyve ağacı çeşitleri için artırılmış sulama normlarının uygulanmasını gerektirecektir.

Meyve fidanlıklarında

Tohum yatakları işlenir ve sulanır.



Birinci yıl fidanlık yataklarında, anaçların aşı gözü ile aşılanması devam eder

İkinci yıl fidanlık yataklarında, gerekirse anaçların aşı noktasının altındaki son göz alma işlemi gerçekleştirilir.

Ana bitki parselleri kontrol edilir ve tüm tip dışı bitkiler sökülür. Boşluklar derhal ana tür bitkilerle doldurulur.

Ağustos sonuna kadar elma, armut, şeftali ve kiraz ağaçları aşılanabilir. Ayın ikinci ve üçüncü on günlük dönemlerinde ayva aşısına başlanır.

Temmuz ayında aşı gözü ile aşılanan anaçlar kontrol edilir ve kalem ile anaç arasındaki kaynaşma iyi olan yerlerde bağlar çıkarılır.

Meyve bahçelerinde

Toprak nemi izlenir ve gerektiğinde sulama yapılır. Yağmur veya sulamadan sonra, oluşan kaymak tabakasını kırmak için sık toprak işlemesi yapılır.

Ağaç sıralarında ve sıra aralarında mekanik yabancı ot kontrolü yapılır.



Ceviz hasadı

Şeftali ve erkenci elma, armut ile erik çeşitlerinin hasadı devam eder. Ayın sonunda, bazı erkenci ceviz çeşitlerinin meyveleri de hasat edilir.

Orta erkenci ve geççi elma, armut ve erik çeşitlerinin hasadına hazırlanmak için gerekli organizasyon çalışmaları yapılır.

Meyve depolama tesisleri dezenfekte edilir ve yeni ürünün alınmasına hazır hale getirilir. Meyve ayıklama makineleri onarılır ve çalışmaya hazırlanır. Yeni bahçeler kurmak için alanların dikim öncesi hazırlığı başlar – derin sürüm, taban gübrelemesi ve tesviye.

Çilek plantasyonlarında



Tüm çilek plantasyonlarının zamanında sulanması çok önemlidir. Yaprak kurumasına izin verilmemelidir. Ağustos ayında bitkiler bir sonraki yılın verimini oluşturur ve optimal bir su rejimi sağlanmalıdır. Plantasyonun yaşına ve toprak tipine bağlı olarak 2-3 sulama yapılır.

Üretim materyali olarak kullanılmayacak bitkilerden sürgünler kesilir.

Ana bitki parsellerine özen gösterilir – yabancı ot kontrolü, sulama ve toprak işleme.

Çileklerin sonbahar dikimi için yeni alanların hazırlanması devam eder. Bazı yüksek rakımlı bölgelerde dikime başlanabilir.

Ahududu plantasyonlarında

Yeni kurulan plantasyonların bakımı devam eder – gerektiğinde sulama yapılır ve yabancı ot varsa toprak işlenmesi yapılır. Meyve veren plantasyonlar, meyvelerin büyüebilmesi ve bir sonraki ürün için çiçek tomurcuklarının oluşabilmesi için sulanır. Ayın sonlarına doğru, yeni yedek sürgünlerin olgunlaşabilmesi için sulama durdurulur.



Ahududu hasadı devam eder

Ana bitki parsellerinin bakımı devam eder – sulama, azotlu gübrelerle üst gübreleme ve toprak işleme. Ağustos sonuna kadar, sürgünler olgunlaşabilsin diye sulama kesilir. Ve ay sonuna kadar meyve vermiş tüm sürgünler kesilir, uzaklaştırılır ve yakılır.

Sonbaharda kurulacak yeni plantasyonlar için alanlar hazırlanır. Toprak, dekar başına 3-5 ton çiftlik gübresi, 80-100 kg süperfosfat (veya aynı miktarda başka bir fosfor bazlı gübre), 25-30 kg potasyum sülfat (veya aynı miktarda başka bir potasyum bazlı gübre) ile gübrenilir.

Siyah frenk üzümü plantasyonlarında

Köklendirme yataklarının ve genç plantasyonların bakımı devam eder. Toprağın kurummasına ve yabancı ot istilasına izin verilmez. Köklendirme yataklarında ve genç plantasyonlarda bitki büyümesinin zayıf olması durumunda, dekar başına 10-15 kg amonyum nitrat (veya aynı miktarda başka bir azot bazlı gübre) ile üst gübreleme yapılır.

Yüksek rakımlı yerlerde meyve hasadı tamamlanır. Plantasyonlar düzenli olarak sulanır ve işlenir.

Diğer ürünlerin bulunduğu plantasyonlarda

Trabzon hurması, aktinidya (kivi), hünnap ve antepfıstığı için anaçların yaz göz aşısı yapılır. Aşılamadan 5-6 gün önce, kabuğun daha iyi ayrılması için fidanlık bolca sulanır. Göz aşısından 3-5 gün önce, kalemler toplanır ve serin bir odada gölgede muhafaza edilir. Aşılanmış Trabzon hurması ve diğer bitkilerin tutma durumu kontrol edilir.

Limon, durgun göz ile aşılanır. Limon fidanları, aşılamadan bir hafta önce ve hemen sonra bolca sulanır.

İncir, deniz topalak ve kuş üvezi için istenen çeşit ve formların işaretlenmesi devam eder, ayrıca aktinidya, kuş üvezi, deniz topalak ve narın yeşil çeliklerle köklendirilmesi yapılır.

Sıcak iklim ürünleri bulunan plantasyonların sulama ve çapalama bakımı devam eder, özellikle yeni kurulan plantasyonlara dikkat edilir.



Deniz topalağı (Hippophae rhamnoides), rakitnik, Sibiryana ananası veya deniz topalak olarak da bilinir, Elaeagnaceae familyasından çiçekli bir bitki türüdür. Bitkinin, dik yamaçlarda toprağı tutan çok iyi gelişmiş bir kök sistemi vardır. Kökler, aktinomiçetlerle simbiyotik bir ilişki sürdürür. Bu ilişki, havadan azot fiksasyonuna olanak tanır. Ayrıca topraktaki çözünmeyen organik ve mineral kaynakları çözünür formlara dönüştürürler.

İncir, deniz topalak ve kuş üvezi meyvelerinin hasadı devam eder.

