

Ağustos Ayında Bahçede Bitki Koruma Faaliyetleri

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 05.08.2024 *Брой:* 8/2024



Elma ve şeftalideki külleme hastalığı hariç, mantar hastalıkları riski neredeyse geçmiştir. Zararlı böcek ve akarların neden olduğu hasar da büyük ölçüde azalmıştır, çünkü eski yapraklar onların gelişimi için uygun değildir. Ayrıca, bunların bir kısmı ara konakçılarına geçer.

Ağustos ayındaki bitki koruma faaliyetleri, esas olarak meyve hasadını kurtlanmadan ve yaprakları yaprak galeri güvelerinden, tahtakurularından ve birkaç nesil geliştiren diğer zararlılardan korumaya yöneliktir.

Uygulamalar, pestisitlerin hasat öncesi bekleme sürelerine ve hasat zamanına uygun olmalıdır. Günün daha serin saatlerinde yapılmalıdır.

Meyve Bahçelerinde

İşleme noktalarında, şeftali meyveleri bulaşık olmayan alanlarda şeftali güvesi varlığı açısından kontrol edilir.

Tüm plantasyonlar, Amerikan beyaz kelebeği varlığı açısından izlenir. Ekonomik zarar eşiği aşıldığında, ürünler Dipel 2 X (100 g/ha) ile ilaçlanır.



Meyve Kabuk Böceği

Meyve kabuk böceği ile bulaşık bahçeler, şu ürünlerden biri ile püskürtülür – Delegate 250 WG (30 g/ha), Rapax 100-200 (ml/ha), Dipel DF 50-150 (g/ha), Avant 150 EC (33.3 ml/ha), Decis 100 EC (8.75-12.25 ml/ha), Coragen 20 SC (16-30 ml/ha). Çiftleşmeyi engelleme için ayrıca kombine feromon dağıtıcıları – Isomate – CLR (100 adet/ha) kullanabilirsiniz.

Kabuk böcekleri ile bulaşık meyve ağaçlarının gövdeleri ve kalın dalları, şu ürünlerden biri ile ilaçlanır – Decis 100 EC (12.25 ml/ha), Coragen 20 SC (30 ml/ha), Sumi Alpha 5 EC (0.03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/ha).

Şeftali bahçeleri, külemeye karşı şu ürünlerden biri ile püskürtülür – Sulfur WG (600 g/ha), Solfo 80 WG (750 g/ha), Systhane 20 EW (0.03%), Luna Experience (50-75 ml/ha), Flint Max 75 WG (0.02%); şeftali güvesi, Anarsia (ikinci nesil), dut kabuklubiti, San Jose kabuklubiti (yayılım alanlarında) karşı deltametrin bazlı bir ürün – Decis 100 EC (12.5 ml/ha), Meteor (90 ml/ha), Dekka EC (50 ml/ha); ve akarlar karşı Apollo 50 SC (40 g/ha),

Valmek (60-96 ml/ha) veya abamectin bazlı başka bir ürün, Voliam Targo 063 SC (75 ml/ha), Naturalis (100-150 ml/ha).

Dökülmüş kurtlu fındık meyveleri toplanır ve imha edilir.

Elma bahçeleri, bir piretroit insektisit – Decis 100 EC (7.5-12.5 ml/ha), Sumicidin 5 EC (0.02%), Afikar 100 EC (15 ml/ha), Efcymerin 10 EC (15 ml/ha) ve sırasıyla yaprak galeri güvesi ve akarlara karşı şu ürünlerden biri – Apollo 50 SC (40 g/ha), Valmek (60-96 ml/ha) veya abamectin bazlı başka bir ürün, Voliam Targo 063 SC (75 ml/ha), Naturalis (100-150 ml/ha) ile ilaçlanır.



Armut Yaprak Piresi ve Tahtakurusu

Armut yaprak piresi ve armut tahtakurusu ile yoğun bulaşık armut bahçeleri, deltametrin bazlı bir insektisit – Decis 100 EC (12.5 ml/ha), Meteor (90 ml/ha), Deka EC (50 ml/ha) ile püskürtülür. Bu ilaçlama, armuttaki elma içkurduna karşı da etkilidir.

Kestane ağaçları, kestane hortumlu böceğine karşı Coragen 20 SC (18-30 ml/ha) ile püskürtülür.

Çilek Plantasyonlarında



Çilek Akarı

Çilek akarı ile bulaşık çilek plantasyonları, şu ürünlerden biri ile ilaçlanır – Voliam Targo 063 SC (80 ml/ha), Laota, Bermektin, Valmek (15-100 ml/ha), Sulfur WG (500-700 g/ha), Heliosulfur C (150-750 ml/ha).

Ağustos ayında dikilmek üzere olan çilek dikim materyali kontrol edilir. Çilek akarı ve diğer zararlılar tespit edildiğinde dezenfekte edilir.

Siyah Frenküzümü Plantasyonlarında



Frenküzümü Tırtılı

Frenküzümü tırtılı ile bulaşık plantasyonlar, tüm grumlardan temaslı insektisitlerle püskürtülür. Şu ürünlerden biri kullanılabilir – Decis 100 EC (12.25 ml/ha), Coragen 20 SC (30 ml/ha), Sumi Alpha 5 EC (0.03%), Karate Zeon 5 SC (15 ml/ha).