

Meyve ağaçlarını Eylül ayında neden ve nasıl korumalıyız?

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 08.09.2024 *Брой:* 9/2024



Vejetasyon döneminin sonuna doğru, hastalıkların gelişimi yavaşlar ancak tamamen durmaz.

İkinci ve üçüncü on günlük dönemin ilk yarısında tahmin edilen yağışlar, olgunlaşan meyve ürününde fungal patojenlerin gelişme riskini artıracaktır – geç kahverengi çürüklük, geç çeşitli meyve ağaçlarının meyvelerinde geç yaprak lekesi.

Zararlı popülasyon yoğunluğu önemli ölçüde azalır. Birçoğu hareketsiz evrelere girmiştir – pupa, yumurta.

Bununla birlikte, ikinci nesil meyve güvesinin geç çıkan larvaları meyve kurtlanmasına neden olmaya devam

etmektedir. Diğer zararlılar da zarar vermeye devam eder. Bu nedenle, bitki koruma faaliyetleri ay boyunca sürer.

Meyve bahçelerinde

Meyve depolama tesisleri dezenfekte edilir. Bu işlem bir uzman tarafından gerçekleştirilir!



Sünger örücü – *Lymantria dispar*

Sünger örücünün kışlayan popülasyonunu belirlemek için 40–60 ağacın gövde ve kalın dallarındaki yumurta kümeleri, ağaç sarıkurdu için ise iki, üç ve dört yaşındaki dallardaki yumurta halkaları sayılır.

Şeftali meyveleri, henüz görülmediği alanlarda şeftali güvesini tespit etmek için işleme noktalarında incelenir.

Hasattan yaklaşık iki hafta önce, meyveleri depolama için olan elma ve armut bahçeleri, geç yaprak lekesi ve meyve depolarında gelişen diğer hastalıklardan korumak için Captan 80 WG (150–180 g/da) ile ilaçlanır.

Armut tomurcuk hortumlu böceğinin popülasyon yoğunluğunu belirlemek için ay sonunda, bahçenin her yerine dağılmış 500 dekar başına 10 ağaç silkelenir – başlangıçta gün aşırı, ilk böcekler bulunduğundan sonra ise her gün.

Kestane ağaçları, ay başında, yumurta bırakmadan önce, kestane hortumlu böceği mücadelesi için Coragen 20 SC (18–30 ml/da) veya başka bir temas insektisidi ile ilaçlanır. İlaçlama 7–10 gün aralıklarla iki kez daha tekrarlanır.

Çilek plantasyonlarında

Dikimden önce, yabancı otsuz parseller için, çilek plantasyonları Roundup Energy (bir yıllık ve iki yıllık yabancı otlar için 300–500 ml/da ve çok yıllık yabancı otlar için 500–800 ml/da) ile ilaçlanır.



Çilek kök hortumlu böceği

Çilek plantasyonları, kök hortumlu böceklerinin larvalarına karşı toprak 15 cm derinliğe kadar nemleninceye kadar, insektisitlerden biri olan Decis 100 EC (17.5 ml/da) veya deltametrin bazlı başka bir ürün, Mospilan 20 SP (30 g/da), Naturalis (300 ml/da) ile sulanır.

Çilek dikim materyali, kendisiyle taşınan hastalık ve zararlılar yönünden incelenir – beyaz ve mor-kahverengi yaprak lekeleri, kök hortumlu böcekleri, çilek nematodu, çilek akarı, viral hastalıklar vb.

Çilek kolları, çilek akarı veya çilek nematodu ile bulaşık ise, 45–50 °C sıcaklıktaki suda 13–15 dakika batırılarak dezenfekte edilir.