

Kışlık kolzanın gecikmiş ekimi ve geç tarım ürünlerinde enfeksiyonlar ile patojen gelişimi için koşullar

Автор(и): Растителна защита
Дата: 18.09.2024 Брой: 9/2024



Uzun süren kuraklığın ardından, ülkenin birçok bölgesinde (Silistre, Varna, Dobriç, Eski Zağra, Burgaz, Hasköy, Sandanski) Eylül ayı başında ekonomik açıdan önemli, 30-40 l/m²'den fazla yağış düştü.

Bu yağışlar, geç tarla bitkileri için bile geç kalmıştı; bu bitkiler, toprak nemi eksikliği ve mevsim normallerinin üzerindeki yaz sıcaklıkları sonucunda gelişimlerini olağan zaman sınırlarından çok daha erken tamamladılar.

Mevcut hafta boyunca da tarımsal meteorolojik koşullar, kararsız hava durumu tarafından belirlenecek. Dönem içinde yağış beklenmekte olup, bu yağışlar üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerini ve mevsimlik toprak

işleme çalışmalarının yürütölme koşullarını iyileştirecektir.

Kuraklık nedeniyle, hassas bir toprak hazırlığı gerektiren bir ürün olan kışlık kanola ekimi için ayrılan alanlardaki ekim öncesi toprak işleme ertelendi. Bu nedenle, ülkenin birçok bölgesinde kanola ekimi, optimal tarımsal teknik son tarihlerden sonra gerçekleştirilecek. Bu tarihler Eylül ayının ikinci on günlük döneminin sonunda dolmaktadır.

Dönemin çoğu gününde, sık yağışlı olması öngörölen serin hava, geç tarım ürünlerinde enfeksiyonlar ve patojen gelişimi için koşul yaratacaktır: meyve ağaçlarında geç yanıklık, bağlarda kurşuni küf, sebze ürünlerinde mildiyö.



Eylöl ayının ikinci on günlük döneminde, sonbahar üretimi için yetiştirilen lahanalarda zararlılar izlenmelidir: lahana beyaz kelebeğı tırtılları, lahana güvesi, lahana pervane böceğı; ve bunların yoğunluğu ekonomik zarar eşiğini (bitki başına 3-5 tırtıl) aştığında, hasat öncesi bekleme süresi kısa olan insektisitlerle mücadele gereklidir.

Yaklaşan dönem, sonbahar üretimi için ıspanak ve diğör yapraklı sebzelerin ekimi için uygundur.

Kaynak: NIMH