

Ekim – agronomik öneme sahip yağışlar ve kışlık kanolanın gelişimi için iyi koşullar

Автор(и): Растителна защита
Дата: 06.10.2024 Брой: 10/2024



Ekim ayında tarımsal meteorolojik koşullar, iklim normalleri civarında ve üzerindeki sıcaklıklar ile aylık ortalamalara yakın yağışlarla belirlenecek. Yaz kuraklığının ardından, Eylül ayında Doğu Bulgaristan'ın belirli bölgelerinde ve Batı Bulgaristan'ın yer yerinde görülen ekonomik açıdan önemli yağışlar, üst toprak katmanlarındaki nem içeriğini ve mevsimlik toprak işleme çalışmalarının yürütülme koşullarını iyileştirdi.

Eylül sonundaki yağışlar düzensiz dağıldı. Orta ve Kuzeydoğu Bulgaristan'ın birçok yerinde 30-35 l/m²'ye kadar ve üzerinde yağış kaydedildi (Veliko Tarnovo - 40 l/m², Ruse - 43 l/m², Razgrad - 36 l/m², Silistra - 45 l/m², Varna - 45 l/m², Dobriç - 53 l/m²), bu da üst toprak katmanlarındaki nem rezervlerinde ve mevsimlik toprak işleme çalışmalarının yürütülme koşullarında önemli bir iyileşmeye yol açtı. Orta ve doğu bölgelerin aksine, Batı ve

Güney Bulgaristan'ın bazı kısımlarında sonbahar başındaki yağışlar ekonomik bir önem taşımadı. Ülkenin bu bölgelerinde, kuru ve sıkışmış toprak, kışlık ürün ekimi için ayrılan alanların derin sürülmesini ve ekim öncesi toprak hazırlığını ciddi şekilde zorlaştırıyor.

Ekim ayının ilk on günlük döneminin çoğu gününde önemli yağış beklenmemekte ve koşullar tarla hazırlığı ile kışlık tahıl ekimine izin verecektir. Yaz kuraklığı, kışlık kanolanın zamanında ekimini engelledi ve Orta Bulgaristan'ın tarım bölgelerindeki bazı yerlerde ekimler tarımsal teknik zaman dilimi dışında gerçekleşecek. Geç ekilen bitkilerin sonbahar vejetasyon döneminde rozet aşamasına girememesi, dolayısıyla ürünün zarar görmeden başarılı bir şekilde kışlamasının garanti edilememesi oldukça muhtemeldir.

Ekim ayında, kışlık tahıl ürünlerinin ekimi için optimal tarımsal teknik dönemler gerçekleşir. Kuzey Bulgaristan için zaman aralığı ayın ilk yarısı, Güney Bulgaristan için ayın ikinci yarısı ve Karadeniz bölgeleri için ise üçüncü on günlük dönemdir. Ayın ilk on günlük döneminin sonu ve ikinci on günlük döneminin başında, ayrıca üçüncü on günlük dönemin ikinci yarısında beklenen yağışlar, buğday ve arpanın vejetasyonunun ilk aşamalarının normal seyri için büyük önem taşıyacaktır. Ekim ayında, ekim tarihlerine bağlı olarak buğdayda şu aşamalar gözlenecektir: çıkış, birinci ve üçüncü yaprak.



Ayın ikinci yarısında öngörülen sıcak hava, tarla faresinin popülasyonunda bir artış için ön koşul olacaktır.

Sonbaharda ekilen ürünlerin bulunduğu tarlalar izlenmeli ve ekonomik zarar eşiğine ulaşıldığında – EZE: 2 aktif koloni/da – ilaçlama yapılmalıdır.

Tarla çalışmaları için uygun koşullar, ikinci on günlük dönemin ortasında ve üçüncü on günlük dönemin ilk yarısında, nispeten kuru hava tahmin edildiğinde olacaktır.



Ekim ayında, kabuklu bitkiden etkilenen elma ve armut bahçelerinde, enfeksiyonu azaltmak için, yaprak dökümünün başlangıcında, meyve hasadından sonra %5'lik üre çözeltisi ile bir ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

Sert çekirdekli meyve türleri için, kitlesel yaprak dökümünden sonra, delikli yaprak lekesi, erken kahverengi çürüklük ve şeftali yaprak kıvrıcıklığı etmenlerine karşı %2'lik Bordo bulamacı ile püskürtme önerilir.

Ekim başında öngörülen yer donları, dona hassas geç sebze ürünlerinden ek üretim imkanlarını sınırlandıracaktır.

Kaynak: NIMH