

Aralık – sıcaklıklar iklim normallarına yakın ve tarımsal açıdan önemli yağış

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2024 Брой: 12/2024



Aralık ayı başında, sıcaklıklarda önemli bir düşüş öngörülmekte olup bu durum, ülkenin tarıma elverişli bölgelerinin çoğunda sonbahar ekili ürünlerdeki vejetasyonun yavaşlamasına ve durmasına yol açacaktır.

Maksimum değerlerin 15-16°C'ye ulaşacağı Doğu Bulgaristan'da, sonbahar ekili ürünlerde kısa süreli bir vejetasyon aktivasyonu için koşullar oluşacak, ancak kışlık tahıl ürünlerinin fenolojik durumunda önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

Ayın başında, uzun süren sonbahar kuraklığının bir sonucu olarak, buğday ekimlerinin büyük bir kısmı gelişmemiş, ilk büyüme aşamasında vejetasyonunu durduracaktır. Kışlık tahıl ürünlerinde çıkış ve ilk yaprak

oluşumu (1-2 yaprak) evreleri hakimdir ve bu da başarılı kışlamaları konusunda şüphe uyandırmaktadır. Sonbaharın ilk yarısında nemin sınırlayıcı bir faktör olmadığı kuzeydoğu bölgelerindeki (Targovişte, Silistre, Provadiya) ekimlerin küçük bir kısmı üçüncü yaprak evresinde ve kardeşlenme başlangıcındadır (Provadiya bölgesi) – kışlama için uygun evre.

Birinci on günlük dönemin sonuna ve ikinci ile üçüncü on günlük dönemlerin çoğu gününde, iklim normallerine yakın öngörülen sıcaklıklar, kışlayan tarım ürünlerini dormansi (uyku) halinde tutacaktır. Ay boyunca, eksi 10°C'ye kadar minimum sıcaklıklar öngörülmekte olup, kar örtüsünün yokluğunda ve daha uzun süre devam etmesi halinde, çıkış ve ilk yaprak oluşumu evrelerindeki gelişmemiş kışlık tahıl ürünleri için kritik olacaktır.

Aralık ayında beklenen, aylık norm civarındaki yağışlar, 50 cm ve 100 cm toprak katmanlarındaki toprak nem rezervlerini artıracaktır.

Aralık başında düşen yağışlar, Orta ve Güney Bulgaristan'ın birçok yerinde 30-40 l/m²'yi aştı (Loveç - 33 l/m², Blagoevgrad - 41 l/m², Sandanski - 42 l/m², Filibe - 42 l/m², Hasköy - 41 l/m², Kırcaali - 50 l/m², Çırpan - 39 l/m²), bu da sonbahar ekili ürünler için üst toprak katmanlarındaki nem açığının giderilmesine yol açtı. İzleyen dönemde, daha fazla tarımsal açıdan önemli yağış ve 50 cm ile 100 cm toprak katmanlarındaki toprak nem rezervi seviyesinde bir artış beklenmektedir.

Kaynak: NIMH (Ulusal Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü)