

Mart ayının başında, yağmur ve kar yağışı toprak nem rezervlerinin seviyesini artıracak.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.03.2025 Брой: 3/2025



Geçtiğimiz yedi günlük dönemde kaydedilen düşük minimum sıcaklıklar, Kuzeybatı Bulgaristan'daki bazı yerlerde ve yüksek vadi tarlalarında Vidin, Kneja, Dragoman ve Kazanlak'ta eksi 13-14°C ve altına kadar inerek, kar örtüsü olmayan koşullarda gelişmemiş sonbahar ürünlerinin soğuğa dayanıklılığını test etti. Bu düzeydeki değerler, daha uzun bir süre korunduğunda, 2-3 yaprak aşamasındaki kışlık tahıl ürünlerinin kışlaması için kritik öneme sahiptir.

Kuzeybatı bölgelerde, Băzovec, Kneja, Kyustendil ve Kazanlak'taki tarımsal meteoroloji istasyonlarındaki ürünlerde olası don hasarı için tarla incelemeleri yapılacaktır.

Şubat ayının son haftasındaki son derece düşük sıcaklıklar, Ruse–Silistra bölgesindeki meyve bahçeleri üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Bazı yerlerde sıcaklıklar eksi 24 dereceye kadar düştü ve bunun sonucunda kayısıların meyve tomurcuklarının büyük bir kısmı dondu, diye paylaşıyor Tuna Meyve Yetiştiricileri Birliği – Ruse Başkanı Nikolay Kolev. Kiraz, şeftali, erik, elma ve armut ağaçlarında da don hasarı gözlemleniyor.

Şubat sonu ve Mart başında sıcaklıklar iklim normallerinin altında olacak, bu da sonbaharda ekilen ürünlerdeki dormansi (dinlenme) durumunu koruyacak. Tahmin edilen minimum değerler, kışlayan tarım ürünleri için kritik eşiklerin üzerindedir.

Beklenen yağmur ve kar yağışları, 50 cm toprak katmanındaki toprak nem rezervleri seviyesini artıracak. Ocak ayı ve Şubat'ın ilk yarısında normalin altında yağış alınması sonucunda, ülkenin büyük bölümünde 100 cm katmandaki toprak nem rezervleri yılın bu dönemi için yetersiz durumda. Önümüzdeki haftanın sonunda kar örtüsü oluşma ve sonbaharda ekilen ürünlerin kışlama koşullarının iyileşme olasılığının arttığı tahmin ediliyor.

Kaynak: NIMH