

Merkezi Güney Bulgaristan bölgesinde Mart ayının üçüncü on günlük döneminde sonbahar ürünlerinin durumu iyidir

Автор(и): доц. д-р Златина Ур, ИРГР, Садово; доц. д-р Евгений Димитров, ИРГР, Садово

Дата: 23.03.2025 *Брой:* 3/2025



Mart ayının ikinci on günlük döneminin sonundaki, çiçeklenme aşamasına girmiş meyve ağaçları için eksi 3°C'nin altında kritik değerler ve negatif minimum sıcaklıklarla seyreden kısa soğuk havanın ardından, mart sonunda agrometeorolojik koşullar bir değişim geçirecek. Dönemin çoğu gününde, tarımsal ürünlerin vejetasyonunu hızlandıracak, normalin üzerindeki sıcaklıklarla karakterize kararsız hava koşulları etkili olacak.



Meyve ürünleri için, kritik minimum sıcaklık riski olmadan, şu aşamalar ilerleyecek: sert çekirdekli meyve türlerinde tomurcuk şişmesi, tomurcuklanma ve çiçeklenme.



Fotoğraf© Doç. Dr. Zlatina UR ve Doç. Dr. Evgeniy Dimitrov

Mart ayının üçüncü on günlük döneminde, kışlık buğday ağırlıklı olarak kardeşlenme aşamasında olacak.

"Orta Güney Bulgaristan bölgesinde mart ayının üçüncü on günlük dönemi için kışlık ürünlerin durumu iyidir," diye paylaşıyor Sadovo'daki Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Zlatina Ur ve Doç. Dr. Evgeniy Dimitrov. Bu yıl, son 5-6 yılın aksine, kar yağdı ve bu kar, toprak nemini takviye etmenin yanı sıra, bitkileri soğuktan (negatif sıcaklıklardan) da korudu. Ekim zamanının ayarlanması sayesinde – ekim sonundan kasım başına kadar – buğday kasım ayında çimlendi ve son yıllarda olduğu gibi kış dinlenmesine girmedir. Bitkiler, şubat ayının ikinci yarısındaki soğuk havayı iyi tolere etti ve ekim alanlarında sararma (bitki yanıklığı) gözlemlenmedi. 5-17 Mart 2025 tarihleri arasındaki bahar sıcaklıklarının bir sonucu olarak, Orta Güney Bulgaristan bölgesinde adi kışlık buğdayın vejetasyonu hızlandı. Şu anda, ekim alanları kardeşlenme aşamasında – yoğun kardeşlenme. Bölgede şimdiye kadar ekonomik açıdan önemli yağışlar olmadı, ancak tahmin edilen yağış miktarlarının gerçekleşeceğini ve normal bitkilerin oluşumuna yardımcı olacağını umuyoruz.

Bir bitki patolojisi uzmanı tarafından yapılan detaylı incelemeler sonrasında, ekonomik açıdan önemli hastalık saldırıları tespit edilmemiştir. Beklenen yağışlar, külleme hastalığının gelişimini ve yayılmasını tetikleyebilir. Ekim alanlarının azotlu gübre ile üstten gübrelemesi, gübre dozunun bir kısmı ile gerçekleştirilmiş olup, yaprak gübreleri ile uygulamalar da yapılmıştır. Tahıl yaprak böceğine (Lema melanopa) karşı insektisit ile ilaçlama yakında yapılacaktır.

Tahıl yaprak böceği buğday verimi için ciddi bir tehdit oluşturuyor

Dönem içinde beklenen sağanak yağışlar, üst toprak katmanındaki nem içeriğini iyileştirecek. Bazı doğu bölgeleri hariç olmak üzere, ülkenin birçok yerinde kışlık tahıl ürünleri altındaki 50 ve 100 cm katmanlardaki toprak nem rezervleri, bahar başlangıcı için yetersizdir. Kuzeybatı Bulgaristan'daki Nikolaevo agrometeoroloji istasyonu gibi yerlerde, toprak nem rezervleri seviyesi alışılmadık şekilde düşük, tarla kapasitesinin %65'inin altındadır.

Önümüzdeki dönemde tahmin edilen sık sağanak yağışlar, meyve ürünlerinde bir dizi hastalığın etmenlerine karşı (kabarcık, çiçek yanıklığı [erken kahverengi çürüklük], şeftali yaprak kıvrıcılığı) bitki koruma ilaçlamalarının uygulanmasını zorlaştıracak. Toprak işleme ve orta-erkenci ilkbahar ürünlerinin ekimi için daha uygun koşullar dönemin başında ortaya çıkacak. Bir sonraki dönem, Güney Bulgaristan'da ayçiçeği ekimi için agroteknik son tarihle örtüşmektedir.

Kaynak: NIMH