

Temmuz Ayında Meyve Bahçesinde

Автор(и): проф.д-р Мария Боровинова, Институт по земеделие в Кюстендил

Дата: 21.07.2015 Брой: 7/2015



Armutlar için uyuz hastalığına karşı ilaçlamaya devam edilmelidir. Bu hastalıkla mücadele için sadece iki fungusit onaylanmıştır - Dithane M-45 – %0.3 ve Luna Experience – 20-75 ml/deka, ancak elma uyuzu ile mücadelede listelenen tüm fungusitler kullanılabilir. Ayrıca meyve kurtlarına ve armut psillidlerine, özellikle yaygın armut psillidine ve armut yaprakbitine karşı da ilaçlama yapılır. Bu zararlıların eşzamanlı kontrolü için aşağıdaki insektisitlerden biri kullanılır: Decis 2.5 EC – %0.03, Decis 100EC – 12.5 ml/deka, Deca EC – 30-50 ml/deka, Karate Express WG – 60-80 g/deka, Vaztak New 10 EC – %0.02, Sineis 480SC – 37.5 ml/deka, Sumi Alpha 5EC – %0.03.

Ayvalar için fungusit uygulaması, kahverengi çürüklük ve kahverengi yaprak lekesine karşıdır; bunun için Horus 50WP – %0.03 veya Luna Experience – 20-75 ml/deka kullanılır. Meyve kurtlarıyla mücadele için, fungusit çözeltisine elma içkurduna karşı listelenen insektisitlerden biri eklenir.

Теммуз ayında **tatlı ve ekşi kirazların** hasadı devam eder ve bu iki ürün için herhangi bir ilaçlama yapılmaz. Hasat sırasında, kiraz sineğinden kaynaklanan kışlama enfeksiyonunu en aza indirmek için tüm meyveler toplanmalıdır. Ayrıca, kahverengi çürüklük enfekte olmuş tüm meyveler bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Genellikle Temmuz ayında, genç ve meyve vermeyen tatlı ve ekşi kiraz bahçelerinde, Haziran ayında kara kiraz yaprakbiti sorunu çözülmemişse ve kiraz yaprak eşekarısı yoğunluğu yüksekse, şu insektisitlerden biriyle ilaçlama yapmak gerekir: Mospilan 20SG – 25g/deka, Karate Express WG – 40-60g/deka, Calypso 480SC – %0.02.

Erikler için Temmuz ayında, fungusit uygulaması pas ve kahverengi çürüklüğe karşı yönlendirilir. Horus 50WG – %0.045 kullanılır. Bu dönemde, erik içkurdu ve yaygın erik kabuklubitine karşı ilaçlamalar devam eder. Erik içkurduna karşı aşağıdaki insektisitlerden biri kullanılır: Vaztak New 100EC – %0.0125, Decis 2.5EC – %0.05, Dursban 4E – %0.15, Coragen 20SC – 16-30 ml/deka, Sumi Alpha 5EC – %0.02, Pirinex 48EC – %0.15, Runner 240SC – %0.03. Listelenen insektisitler arasında, Vaztak New 100EC – %0.02, Dursban 4E – %0.1 ve Pirinex 48EC – %0.15 aynı zamanda yaygın erik kabuklubitine karşı da etkilidir, bu da bu zararlıların eşzamanlı kontrolü için kullanılmalarına olanak tanır.

Temmuz başında, erkenci şeftali çeşitlerinde meyve olgunlaşması başlar ve bu dönemde onlar için herhangi bir ilaçlama yapılmaz. Geç çeşitler için, kahverengi çürüklük, doğu meyve güvesi ve şeftali dal kurduna karşı ilaçlama gereklidir. Kahverengi çürüklüğe karşı, onaylanmış üç fungusit olan Delan 700 WDG – %0.05, Horus 50WG – %0.045 ve Luna Experience – 63-75 ml/deka arasında, en kısa hasat öncesi aralığına sahip olduğu için Luna Experience en uygundur. Doğru meyve güvesine karşı, aşağıdaki insektisitlerden biri kullanılır: Avant 150EC – 33.3 ml/deka, Karate Express WG – 100-120 g/deka, Eforia 045 – 150 ml/deka, Nexide 015SC – %0.03, Decis 2.5EC – %0.04, Sumi Alpha 5EC – %0.02; ve şeftali dal kurduna karşı ise şu insektisitlerden biri: Karate Express WG – 100-120 g/deka, Sumi Alpha 5EC – %0.02, Dursban 4E – %0.15, Vaztak New 100EC – %0.015.

Hasattan sonra, **çilek plantasyonlarının** yaprakları biçilir, plantasyondan uzaklaştırılır ve yakılarak veya gömülerek çürümeye bırakılarak imha edilir. Çilek akarı yoğunluğu yüksekse, genç yapraklara zarar gelmesini önlemek için ilaçlama yapılır. Onaylı bitki koruma ürünleri listesinde yer alan çilek akarını kontrol etmek için bir akarisit bulunmamaktadır. Doç. Dr. Elena Tsoleva'ya göre, Bi-58 – %0.1 - %0.15 veya %0.3-0.5 konsantrasyonda Nimazal TS'den çok iyi sonuçlar alınmaktadır.

Temmuz ayındaki sıcaklıklar yüksektir, bu da ilaçlamanın sabah erken saatlerde veya akşam, sıcaklıklar 25°C'nin altındayken yapılmasını gerektirir. Ayrıca, bu dönemde bazı bölgelerde geç olgunlaşan tatlı ve ekşi kiraz hasadının devam ettiği ve elma, erik ve şeftalilerde erkenci çeşitlerin hasadının başladığı göz önüne alındığında, hasat öncesi aralığı kısa olan ürünlerin kullanılması çok önemlidir.

