

Mayıs ayının son haftasında tarımsal ürünlerin gelişimi, iklim normallerinin altındaki sıcaklıklar ve ekonomik yağışlar koşullarında ilerleyecek.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 26.05.2025 Брой: 5/2025



Önümüzdeki yedi günlük dönemde tarımsal meteorolojik koşullar, istikrarsız hava durumu tarafından belirlenmeye devam edecek. Dönem içinde tarımsal açıdan önemli yağışların yanı sıra, topraktaki nem rezervlerinde daha derin toprak katmanlarında bile bir iyileşme öngörülmektedir.

Mayıs ayının birinci ve ikinci on günlük dönemlerindeki yağışlar düzensiz dağılmıştır. Güney Bulgaristan'ın birçok yerinde Mayıs yağışları aylık normlara ulaşmış ve aşmıştır (Blagoevgrad, Haskovo, Kırcaali, Elhovo, Çırpan, Karnobat, Burgas). Güney bölgelerin bir kısmında, 50 ve 100 cm katmanlardaki toprak nem rezervleri, kışlık tahıl

ürünleri ve ekilen ilkbahar ürünlerinin gelişimi için optimal olan tarla kapasitesinin (FC) %85'ine kadar ve üzerinde seviyelere ulaşmıştır.

Güney bölgelerin aksine, Kuzeydoğu Bulgaristan'daki bazı yerlerde (tarımsal meteoroloji istasyonu Silistra), Nisan ve Mayıs'ın ilk yarısındaki normalin altındaki yağışlar sonucunda, ikinci on günlük dönemin sonunda kışlık tahıl ürünleri için toprak nem rezervleri seviyesi düşüktür – tarla kapasitesinin %65'inin altında.

Mayıs ayının son haftasında, kuzeydoğu bölgelerde toprak nem rezervlerinde önemli bir iyileşme beklenmektedir; bu durum, toprak nemi için yüksek gereksinimlere sahip olan kışlık tahıl ürünleri için büyük önem taşımaktadır.

Dönem içinde, tarımsal ürünlerin gelişimi iklim normlarının altındaki sıcaklıklarda ilerleyecektir. Mayıs sonuna kadar, kışlık tahıl ürünlerinde tane oluşumu ve tane dolumu gerçekleşecektir.



Bu inter-faz döneminde, buğdaya süne larvaları zarar vermektedir; bu da ekili alanların tarla kontrollerini gerektirmekte ve zararlı yoğunluğu ekonomik zarar eşiğini (2 larva/m^2) aştığında, ilk fırsatta ilaçlama yapılmalıdır.

Ayçiçeği ve mısırdaki yaprak oluşumu gerçekleşecektir.

Mayıs sonunda, asmada çiçek salkımlarının çiçeklenmesi baskın olacaktır; bu, mildiyö ve külleme ile enfeksiyon için kritik bir aşamadır.

Mayıs ayının son haftasında, üst toprak katmanlarındaki artan nem içeriği, mevsimlik toprak işleme operasyonlarının uygulanmasını kısıtlayacaktır. Dönem içinde dolu beklenmektedir. Doldan etkilenen meyve ağaçları, sebze ürünleri ve bağlar için, patojenlerin neden olduğu sekonder enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla bakır içeren fungusitlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

Kaynak: NIMH